

Benevia 100 OD

Benevia® 100 OD on süsteemne insektitsiid kartulil kasutamiseks. Laiendatud kasutusala väikese kasvupinnaga kultuuridele: avamaal sibul, tali- ja šalottsibul, küüslauk, porgand, pastinaak, juurpetersell, seller, söögipeet, mädarõigas, maapirn, redis, mustjuur, kaalikas, naeris, peakapsas, punane kapsas, brokoli, lillkapsas, brüsseli kapsas, maasikas, kasvuhoones baklažaan, tomat, kõrvitsalised, salat ja lehtsalat, dekoratiivtaimed.

Toime

Benevia® 100 OD on süsteemne insektitsiid, mis toimib läbi kahjurite välise kesta ning sooletrakti tõrjudes taimeosi närivaid ja imevaid kahjureid. Putukad halvatakse mõne tunni jooksul, lõpetavad söömise ja liikumise, kuid võivad taimele jääda veel mitmeks päevaks. Lõplik toime avaldub 3–6 päeva möödudes pärast kasutamist.

Kasutamine

Laiendatud kasutusala väikese kasvupinnaga kultuuridele: avamaal sibul, talisibul, šalottsibul, küüslauk, porgand, pastinaak, juurpetersell, seller, söögipeet, mädarõigas, maapirn, redis, mustjuur, kaalikas, naeris, peakapsas, punane kapsas, brokoli (spargelkapsas), lillkapsas, brüsseli kapsas (rooskapsas), maasikas avamaal ja kasvuhoones, kasvuhoones baklažaan, tomat, kõrvitsalised (kurk, melon, arbuus, suvikõrvits jne), salat ja lehtsalat, dekoratiivtaimed ja lilled. NB! Kuna on laiendatud kasutamiseks eelmainitud kultuuridele professionaalse kasutaja taotluse alusel, vastutab toote tõhususe või fütotoksilisuse eest selle kasutaja.

Kulunorm sõltub kultuurist ning jääb vahemikku 125–1200 ml/ha.

Kasutada kahjuritega nakatumise varajases staadiumis. Täpsemad juhised leiad [infolehest](#).

Mesilaste ning muude tolmeldavate putukate kaitsmiseks mitte kasutada põllumajanduskultuuride õitsemise ajal. Õitseva umbrohu olemasolu korral mitte kasutada. Õitsevate taimede puudumisel lubatud kasutada vahemikus 22:00 kuni 05:00. ***Erand: Õitsemise aegne kasutus maasikal on lubatud vahemikus 22:00 kuni 05:00.***

Vihmakindlus on 2 tundi peale töötlemist Benevia® 100 OD'ga.

Kasutuspiirangud

Kasvuhoones kasutamine

Mitmekordne kasutamine kasvuhoonetes on lubatud ainult suletud ja kinnise süsteemiga kasvuhoonetes, kus taimekasvatus ja toitainete või kemikaalide ringlus on eraldatud väliskeskkonnast ning äravoolu ei lasta loodusesse. Kasutatud mulda ei tohi komposteerida ning tuleb käidelda kui ohtlikku jäädet.

Kui kartulit on töödeldud Benevia® 100 OD-ga kasvuperioodi jooksul kaks korda ning teistel põllukultuuridel, mida on töödeldud Benevia® 100 OD-ga kasvuperioodi jooksul ühe korra, ei tohi samal

kalendriaastal kasutada muid tsüantraniliprooli sisaldavaid tooteid. Lisaks tuleb põhjavee kaitsmiseks pidada kinni kultuurile, kulunormile ja kasutusajale vastavast kasutuspiirangust, mille leiab kultuuride KASUTAMINE tabelitest.

Paagisegud

Enne taimekaitsevahendi kasutamist veenduda, et pritsimiseks kasutatavad seadmed on puhtad. Segamiseks teiste taimekaitsevahenditega võtke ühendust toote edasimüüjate või registreerimise omaniku esindajatega. Benevia®100 OD segude teiste taimekaitsevahenditega toimet inimeste tervisele, keskkonnale ja tõhususele ei ole hinnatud

Dokumendid

[Registri andmed](#)

activeIngredient:

tsüantraniliprool 100 g/l (10,26%)

Pakend:

1 l, õlidispersioon (OD)

costRate:

125–1200 ml/ha

waterAmount:

150–1000 l/ha

Taimekaitsetunnistus nõutav:

Ei

Tootja

FMC Agricultural Solutions A/S