

Benta 480 SL

Benta 480 SL on kontaktse toimega herbitsiid lühiealiste kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks hernel, maisil, suviteraviljadel ristiku või lutserni allakülviga, ristiku ja kõrreliste heintaimede seemnepõldudel ning ristiku ja kõrreliste heintaimedega rohumaadel (karjamaa ja niit).

Kasutamine

Parimate tulemuste saamiseks vali pritsimiseks soe (20°C), kõrge õhuniiskusega (70–90%) ja päikesepaisteline ilm. Üle 20°C õhutemperatuuri korral mitte pritsida päeval, vaid hommikul või õhtul! Öine õhutemperatuur ei tohiks langeda alla 7–8°C. Mitte pritsida vihma ajal ega ka siis, kui umbrohi on kastemärg. Pilves ja külm ilm vähendab Benta 480 SL mõju. Mitte pritsida öökülma ohu korral.

Vihmakindlus: 6 tund pärast pritsimist.

Suviteravili ristiku allakülviga segus kõrreliste heintaimedega (karjatamiseks ja/või niitmiseks)

Kulunorm 1–1,5 l/ha. Pritsida umbrohu idulehtede faasis, kui ristikul on moodustunud 1. kolmetisleht.

Tõrjub kaheidulehelisi umbrohtusid: kummel, valge hanemalts, isekülvanud raps, kukemagun jt. Ooteaeg: 70 päeva

Suviteravili ristiku või lutserni allakülviga (karjatamiseks ja/või niitmiseks)

Kulunorm 1,25 l/ha. Pritsida umbrohu idulehtede faasis, kui ristikul ja lutsernil on moodustunud 1. kolmetisleht.

Tõrjub kaheidulehelisi umbrohtusid: kummel, valge hanemalts, isekülvanud raps, kukemagun jt. Ooteaeg: 70 päeva

Odra/ herne segatis

Kulunorm 1,0 l/ha. Pritsida kevadel (umbrohu idulehtede faasis).

Tõrjutavad umbrohud: Valge hanemalts, kukemagun, erilehine linnurohi, harilik kirburohi, kummel, mailased, isekülvanud raps, harilik hiirekõrv, vesihein, põldkannike, iminõgesed, harilik ristirohi, kare kõrvik ja kollane jaanikakar.

Ooteaeg: 70 päeva

Suviteravili ristiku allakülviga (seemnepõllud)

Kulunorm 1,25 l/ha. Pritsida umbrohu idulehtede faasis, kui ristikul on moodustunud 1. kolmetisleht.

Tõrjub kaheidulehelisi umbrohtusid: kummel, valge hanemalts, isekülvanud raps, kukemagun jt. Oluline on, et allakülv külvatakse sügavusele, kus puudub otsene kontakt umbrohtude ja töölahusega. Ooteaeg: 70 päeva

Hernes (kaunadega või kaunadeta)

Ühekordne pritsimine: kulunorm 1,0 l/ha. Pritsida umbrohtu esimeste idulehtede faasis. Kahekordne pritsimine: pritsida umbrohu esimeste idulehtede faasis kulunormiga 0,4 l/ha. Korrata pritsimist 7–10 päeva pärast kulunormiga 0,5 l/ha. Ooteaeg: 49 päeva

Hernes (kuivatamiseks või loomasöödaks)

Kulunorm 1,0 l/ha. Pritsida umbrohu esimeste idulehtede faasis.

Kahekordne pritsimine: pritsida umbrohu esimeste idulehtede faasis kulunormiga 0,4 l/ha. Korrata pritsimist 7–10 päeva pärast kulunormiga 0,5 l/ha. Ooteaeg: 63 päeva

Ristiku seemnepõllud

Kulunorm 1,5 l/ha Benta 480 SL + kleepaine. Pritsida mai kuus, eelpool kirjeldatud ilmastikutingimusi arvestades. Kasuta väiksemat kulunormi, kui päevane õhutemperatuur on üle +15°C ja öine üle +10°C. Tõrjutavad umbrohud: roomav madar e virn, ristõielised umbrohud, kummel roseti faasis. Ooteaeg: 42 päeva

Kõrreliste heintaimede seemnepõllud

Pritsida saagiaasta kevadel kui kõrrelised heintaimed ja umbrohud on tärganud (aprilli lõpus või mai alguses). Kulunorm 2,0 l/ha (võib lisada kleepainet). Ooteaeg: 42 päeva

Kõrrelised heintaimed või ristik karjatamiseks ja/või niitmiseks

Pritsida saagiaasta kevadel kui kõrrelised heintaimed ja umbrohud on tärganud (aprilli lõpus või mai alguses). 2,0 l/ha Benta 480 SL (võib lisada kleepainet). Ooteaeg: 14 päeva

Mais

Kahekordne pritsimine: kulunorm 0,4 l/ha + kleepaine. Pritsida umbrohu idulehtede faasis. Teine pritsimine kulunormiga 0,5 l/ha Benta 480 SL + kleepaine. Korrata pritsimist 7–10 päeva pärast kui umbrohud on uuesti tärganud. Parima tulemuse saamise eelduseks on õigeaegne pritsimine, sest mõlemad pritsimised on mõeldud üheks kombineeritud lahenduseks.

Ühekordne pritsimine: 1,0 l/ha Benta 480 SL + kleepaine. Pritsida umbrohtude 2–3 lehe faasis.
Eelpool kirjeldatud ideaalsete tingimuste korral ja 2 eelnevat plaani arvestades tõrjutakse järgnevaid umbrohtusid: must maavits, valge hanemalts, roomav madar e virn, kuid võib osutada vajalikuks järgnev pritsimine teise tootega või paagisegus teiste preparaatidega. Ooteaeg: 14 päeva
Pritsimiskordade arv: 1–2

Dokumendid

[Registri andmed](#)

[Ohutuskaart](#)

activeIngredient:

480 g/l bentasoon

Pakend:

5 l, vesilahus

waterAmount:

ca 200 l/ha

costRate:

ühekordne pritsimine 1,0–2,0 l/ha

Taimekaitsetunnistus nõutav:

Ei

Tootja

Sharda Cropchem