

LALSTOP G46 WG

LALSTOP G46 WG on biofungitsiid, mis on mõeldud seemnete ja mulla kaudu levivate seenhaiguste tõrjeks erinevate põllukultuuride seemikutel, kõrvitsalistel, kurgil, tomatil, paprikal, baklažaanil, salatil ja dekoratiivtaimedel kasvuhoones ning maasikatel kasvuhoones, avamaal ja tunnelis kasutamiseks.

Koostis

Toode sisaldab *Clonostachys rosea* tüve J1446 eoseid ja seeneniidistikku. Mikroorganismid võivad esile kutsuda ülitundlikkuse reaktsioone.

Toime

Juurehaiguste *Pythium*, *Phytophthora*, *Rhizoctonia*, *Fusarium*, hahkhallituse *Botrytis cinerea* ja askohütoosi (*Didymella bryoniae*) põhjustatud seenhaiguste tõrjeks mitmesugustel põllukultuuridel kasvuhoonetes, tunnelites ja avamaal.

Eeldada võib kasutusjuhendis nimetatud seenhaiguste madalat kuni mõõdukat tõrjet. Toode ei ole kasulikele organismidele kahjulik.

Kasutamine

LALSTOP G46 WG-d võib kasutada ka mahepõllumajanduslikus tootmises kooskõlas määrusega (EÜ) nr 834/2007.

LALSTOP G46 WG biofungitsiidi kasutatakse ennetavalt.

Laiendatud kasutusala väikese kasvupinnaga kultuuridele: maasikas, vaarikas, põlduba, mustikas, aedmurakas, porgand, juurviljad, sibul- ja mugulköögiviljad, salatid ja lehtköögiviljad, tomat, kurk, kapsalised, paprikad, kõrvitsalised, seemikud, puude seemikud, dekoratiivtaimed, viliköögiviljad, baklažaan, maitsetaimed, sigur, õun ning golfi- ja spordiväljakute muru. NB! *Kuna toode on laiendatud kasutamiseks eelmainitud kultuuridele professionaalse kasutaja taotluse alusel, vastutab toote tõhususe või fütotoksilisuse eest selle kasutaja.*

LALSTOP G46 WG biofungitsiidi kasutatakse vesisuspensioonina.

Vesisuspensiooni valmistamine:

Esmalt segage LALSTOP G46 WG väheses koguses külma veega (nt 100 grammi 5 liitri kohta). Jätke suspensioon 5–10 minutiks seisma. Segage korralikult, kuni suspensioon on homogeenne, ning seejärel lahjendage lõpliku kontsentratsioonini.

LALSTOP G46 WG vesisuspensiooni kasutatakse pritsimise, sissekastmise, tilkkastmise või kasvusubstraati lisamise teel.

Lisage LALSTOP G46 WG suspensiooni tilkkastmissüsteemi segamispaaži kaudu või eraldi pritsepumba kaudu.



LALSTOP G46 WG veeseгу tuleb kasutamise ajal pidevalt segada. Töölаhus tuleb ära kasutada koheselt.

Suspensiooni kontsentratsioon: 0,05% (100 g Lalstop G46 WG / 200 liitri vee kohta)

Ooteaeg: 1 päev.

LALSTOP G46 WG kasutuskogused ja vee segu tarbimine on toodud [kasutusjuhendi tabelis](#).

Paagisegud

Ärge segage LALSTOP G46 WG segamispaagis koos keemiliste pestitsiididega ega kontsentreeritud väetiselahustega.

Säilitamine

Tavaline pakend (mitte vaakumpakend): säilimisaeg 18 kuud alates tootmise kuupäevast, kui toodet ladustatakse temperatuuril +4°C ning 12 kuud, kui toodet ladustatakse temperatuuril +25°C. Vaakumpakend: säilimisaeg 18 kuud alates tootmise kuupäevast, kui toodet ladustatakse temperatuurivahemikus +4°C kuni +25°C. **Avatud pakendis on toote säilimisaeg 1 kuu, kui toodet ladustatakse temperatuuril +4°C.**

Pakend:

100 g ja 1 kg, märguvad graanulid (WG)

waterAmount:

kohandada vastavalt substraadi kastmisvajadusele

costRate:

0,05%-line lahus või 20–25 g/1000 taime

activeIngredient:

Clonostachys rosea tüve J1446, 1 × 10⁹ KMÜ/g (900 g/kg)

Taimekaitsetunnistus nõutav:

Ei

Tootja

DANSTAR FERMENT A.G