

Metazamix

Metazamix on selektiivse toimega herbitsiid laialeheliste ja kõrreliste umbrohtude leviku piiramiseks tali- ja suvirapsi ning suvirüpsi põldudel.

Toime

Metazamix sisaldab kolme toimeainet – metasakloori, aminopüraliidi ja pikloraami. Metazamix hävitab mulla ja lehtede kaudu paljusid laialehisi ja kõrrelisi umbrohtusid, kaasa arvatud kukemagun, rukkilill, valge hanemalts, roomav madar ja harilik kesalill.

Kasutamine

Pritsimiskordade arv: 1 kord hooaja jooksul samal põllul.

Metazamix on vihmakindel üks tund pärast põllule pritsimist.

Metazamix-i võib kasutada igat tüüpi muldadel. Herbitsiidi Metazamix-i ei tohi kasutada liigvee all kannatavatel põldudel või põldudel, millel võib ajuti esineda liigvett.

Ärge kasutage tärkamiseelset pritsimist (BBCH 00–09) kui:

- põllukultuur on hajusalt külvatud.
- kultuur on hakanud tärkama (st 48 tundi pärast külvamist).
- seeme ei ole kaetud 15 mm paksuse mullakihi.
- on oodata tugevat vihma.
- külvimuld on kuiv, paakunud või lahtine.
- kultuurid on hilja külvatud.
- on kerged mullad, liivmullad, vähese orgaanilise aine sisaldusega kerged mullad.

Taliraps

Kulunorm 0,6–0,8 l/ha. Pritsida võib sügisel tärkamisjärgselt nähtava idulehtede maapinnale ilmumise faasist kuni 4. pärislehe faasini (BBCH 10–14).

Suviraps

Pritsida võib tärkamisest kuni 4. pärislehe faasini (BBCH 10–14) kulunormiga 0,75 l/ha või kevadel enne põllukultuuride tärkamist (BBCH 00–09) kulunormiga 1,0 l/ha.

Et kindlustada Metazamix-i tõrjeefektiivsus valge hanemaltsa suhtes suvirapsil, tuleb lisada märgajat (näiteks Dassoili 0,2%-line lahus), mis aitab parandada tilga suurust ja jaotumist lehe pinnal ning sellega saavutada parem katvus lehtedel.

Suvirüps

Kulunorm 1,0 l/ha. Pritsida võib kevadel enne põllukultuuride tärkamist (BBCH 00–09). **Mitte kasutada sortidel Mendel ja Quartz ning seemnekasvatustes.**

Soovitav pritsimiskogus on 100–300 liitrit vett hektari kohta. Kasutage töödeldava umbrohu lehe arengule ja kultuuri tihedusele vastavat pihustit ja pritsimistehnikat.

Mitte töödelda stressis kultuuri. Stressi võivad põhjustada mitmed tegurid, sealhulgas külm, põud, liigvesi, mikroelementide puudus, haigused, kahjurirünnakud jne. Vältige topeltpritsimist põlluservades.

Metazamix võib vahel põhjustada kerget lühiajalist taime kollasust (kestvusega 2–3 nädalat), lehtede deformeerumist (lehed muutuvad teelusika kujuliseks), kasvu aeglustumist. See aga ei mõjuta rapsi ja rüpsi edasist kasvu, saagikust ega saagi kvaliteeti.

Lisamärkused

Rapsiõled tuleb jätta põllule, mitte kasutada neid loomasöödaks või allapanuks. Põhku võib kasutada energia tootmiseks, nt põletamiseks.

Paagisegud

Teiste toodetega segamisel paagisegudes, palun võtta lisainformatsiooni saamiseks ühendust toote kohaliku edasimüüjaga.

Dokumendid

[Registri andmed](#)

[Ohutuskaart](#)

activeIngredient:

Metasakloor 500 g/l, aminopüraliid 5,3 g/l ja pikloraam 13,3 g/l

Pakend:

5 l, suspensioonikontsentraat

costRate:

0,6–1,0 l/ha

waterAmount:



100–300 l/ha

Taimekaitsetunnistus nõutav:

Ei

Tootja

Corteva, Inc. (Corteva Agriscience)

