

Amblyseius californicus

Amblyseius (Neoseiulus) californicus on röövlest, keda kasutatakse punase kedriklesta ennetavaks tõrjeks või kui kahjureid on vähe.

Tutvustus

Röövlesta *Amblyseius californicus* (foto autor Katrianna Leino) areng munast täiskasvanud isendini kestab 7–10 päeva (25 juures). Kõrgemate temperatuuride korral arenguks kuluv aeg lüheneb ning arengutsükkel võib kokku kesta vaid 4 päeva.

Areng on kõige parem soojades ja niisketes tingimustes, kuid *Amblyseius californicus* saab hakkama ka madalama õhuniiskuse korral (40% – 60% ja 10 – 40 °C juures). Oluliselt jahedamad või kuumemad temperatuurid aeglustavad või pärsivad röövlesta paljunemist ja arengut. Suurem õhuniiskus on vajalik kõrgemate temperatuuride korral.

Kasutamine

Kuna *Amblyseius californicus* talub kuuma ja kuiva õhku paremini kui *Phytoseiulus persimilis*, on kuumades ja kuivades tingimustes soovitatav kasutada teda koos röövlesta *Phytoseiulus persimilis*’ega, et kedriklesta tõrje oleks tõhusam.

Puistatavad röövlestad

Puistake lahtised röövlestad otse taimede lehtedele. **Jaotage nad taimedele esimesel võimalusel, kuid mitte keskpäevase kuumuse ajal.** Enne kasutamist pöörake pudelit õrnalt, et röövlestad jaotuksid kandeaines ühtlaselt. Kandke kasurid otse taime lehtedele. Jagage kogu pakendi sisu kõikide taimede peale ära. Kuna röövlestad ei lenda, ei suuda nad iseseisvalt taimelt taimele levida. Ühtlase pealekandmise tagamiseks hoidke röövlestate pudelit enne pealekandmist jahedas, et kasurid ei roniks pudeli otsa, vaid jääksid ühtlaselt kandeaine sisse.

Pigem kasutage röövlesti rohkem kui liiga vähe.

Kulunorm varieerub sõltuvalt kahjurite arvukusest 10 – 50 tk/m². Soovitus: 2000 röövlestast piisab, kui on vähem kui 100 taime. Pigem kasutage röövlesti rohkem kui liiga vähe.

NB! Röövlesta *Amblyseius californicus* puistes tootekasutamine võib põhjustada allergilist reaktsiooni! Allergia esinemise oht on suurem, kui kasutada toodet suurtes kogustes ja väga sagedasti.

Röövlesti sisaldavad kotikesed

Röövlesta *Amblyseius californicus* kotikesi kasutatakse ennetavaks tõrjeks või kui kahjureid on vähe. Kotikesed riputatakse taimede külge või vastu taime vart. Röövlestad paljunevad kotikeses tänu seal olevatele toidulestadele. Kotikeses on nõelapeasuurune auk, mille kaudu osa röövlesti tuleb taimede peale

saaki otsima, osa jääb kotikesse ja paljuneb seal enne taime peale siirdumist. Röövlesti väljub kotikesest olenevalt tingimustest 4–7 nädala jooksul.

Kulunorm: iga suurema taime jaoks on vaja ühte kotikest. Väiksemaid taimi saab liigutada üksteisele nii lähedale, et lehed puutuvad kokku ning röövlestad levivad ühest kotist mitmele taimele (2–10 taime kohta üks kotike).

NB! Kotikesi ei tohi avada!

Mitte kasutada keemilisi taimekaitsevahendeid vähemalt üks nädal enne röövlestad taimedele levitamist.

Röövlestad ei edene kuivas siseõhus, seega ei garanteeri me tõrje õnnestumist siseruumides.

Ei sobi kasutamiseks tomatil, sest tomati kleepuvad karvad takistavad röövlesta liikumist.

Punase kedriklesta tõrje

Amblyseius californicus **sobib kasutamiseks:**

- **erinevatel köögiviljakultuuridel**, nagu paprika, piprad, baklažaan, kurk
- **dekoratiivtaimedel**, nagu roos, krüsanteem
- **kasvuhoonekultuuridel ja puukoolides.**

Amblyseius californicus/m ²		Kordus
Ennetav tõrje	1–2 tk/m ² (vajadusel rohkem)	Iga kolme nädala tagant
Kahjureid vähe	4–25 tk/m ²	Iga 2–3 nädala tagant
Kahjureid palju	Kahjurite suure arvukuse korral röövlesta <i>A. californicus</i> kedriklesta tõrjeks ei kasutata	

Transportimine ja säilitamine

NB! Kasureid tuleb transportida jahedas, vältides nende ülekuumenemist. Kui kodutee on pikem, tuleks kasutada termoskotti koos külmaelemendiga. Veenduge, et kasureid sisaldav pudel ei puutuks otseselt külmaelemendiga kokku. Külmaelemendi ja pudeli vahele võib panna näiteks mingi riideeseme või ajalehe.

Säilitamine: võib säilitada lühiajaliselt (1–2 päeva) pimedas, temperatuuril 8–10 .

Tooted

2000 röövlesta 250 ml pakendis
10 000 röövlesta 500 ml pakendis
25 000 röövlesta 1 l pakendis
10 kotikest taimede külge riputamiseks
50 kotikest taimede külge riputamiseks
100 kotikest taimede külge riputamiseks
250 kotikest taimede külge riputamiseks

Kasutus:

kasutatakse punase kedriklesta ennetavaks tõrjeks või kui kahjureid on vähe. Ei sobi kasutamiseks tomatil.

Kahjurid:

punane kedriklest

costRate:


4-25 tk/m² iga 2-3 nädala tagant

Taimekaitsetunnistus nõutav:

Ei

Tootja

Biotus Oy



biotus

<https://biotus.fi/>