

Amblyseius swirskii

Amblyseius swirskii on röövlest, keda kasutatakse karilaste ja ripslaste tõrjeks.

Tutvustus

[Teave kasurite tellimise ja kaubale järele tulemise kohta.](#)

Toime

Amblyseius swirskii't (foto autor: Jarmo Holopainen) kasutatakse ripslaste ja karilaste tõrjeks, eriti kui need kaks liiki esinevad taimedel üheaegselt. On leitud, et see röövlest mõjub ka mõningal määral punase kedriklesta arvukusele, kuid kedriklesta tõrjeks *Amblyseius swirskii*'t siiski kasutada ei soovitata. Sobivates tingimustes hoiab ta kedriklesta enam-vähem kontrolli all, aga kui tingimused muutuvad kedriklesta jaoks soodsamaks, ei saa *swirskii*- röövlest enam hakkama ja sel juhul on vaja kasutada röövlesta *Phytoseiulus persimilis*.

Röövlestad toituvad ripslaste ja karilaste noortest arengujärkudest. Punast kedriklesta (peamiselt munad) sööb *swirskii* „kõrvalproduktina“.

Amblyseius swirskii on aktiivne, kui temperatuurid on pidevalt üle 22 °C ning arenemiseks on vajalik õhuniiskus üle 60 %.

Kasutamine

Kasuta puistatavaid röövlesti ainult siis, kui taimedel juba esineb või on teada, et sinna igal juhul ilmuvad kahjurid (nt. eelmised kultuurid on olnud nakatunud). Puistatavad röövlestad toimivad kiiremini kui kotikestes levitatavad röövlestad, kuid nad ka kaovad taimedelt kiiremini (eriti talvel ei asusta röövlestad korralikult taimi).

NB! Röövlesta *Amblyseius swirskii* puistes tootekasutamine võib põhjustada allergilist reaktsiooni! Allergia esinemise oht on suurem, kui kasutada toodet suurtes kogustes ja väga sagedasti.

Kui uutel taimedel ei esine kahjureid ja neid ei ole ka oodata, saab kasutada röövlesti sisaldavaid kotikesi. Kotikestes olevad toidulestad võimaldavad *swirskii*-lestadel kotis paljuneda umbes 4 nädala jooksul. Pärast seda tuleb vahetada kotikesed uute vastu.

Ripslaste kohta loe lähemalt [siit](#).

Karilaste kohta loe lähemalt [siit](#).

Toodet ei saa kasutada tomatitel (*swirskii*-röövlestad ei suuda liikuda tomatilehtede kleepuvate karvade sees).

Karilaste tõrje

Röövlestad kotikestes: riputa ennetavalt igale 2. – 3. taimele. Korda 3 – 4 nädala tagant. Kui karilasi on rohkem, kasuta kotikestele lisaks lahtiseid röövlesti .

Ripslaste tõrje

Röövlestad kotikestes: riputa ennetavalt igale 2. – 3. taimele. Korda 3 – 4 nädala tagant. Kui ripslasi on rohkem, kasuta kotikestele lisaks lahtiseid röövlesti .

Kui taimedel esineb ainult ripslasi, on alternatiiviks röövlesta *Amblyseius cucumeris* kasutamine kas lahtiselt või kotikestes.

Amblyseius swirskii sobib kasutamiseks:

erinevatel köögiviljakultuuridel, nagu paprika, piprad, kurk, baklažaan
dekoratiivtaimedel, nagu roos, gerbera
kasvuhoonekultuuridel.

Amblyseius swirskii/m2		Kordus
Ennetav tõrje	100 tk/m2 üks nädal pärast istutamist	Korrake vastavalt seire tulemusele (nt. kolm korda 1–2 nädala tagant)
Kahjureid vähe	150–200 röövlesta/m2	
Kahjureid palju	250 röövlesta/m2	

Transportimine ja säilitamine

NB! Kasureid tuleb transportida jahedas, vältides nende ülekuumenemist. Kui kodutee on pikem, tuleks kasutada termoskotti koos külmaelemendiga. Veenduge, et kasureid sisaldav pudel ei puutuks otseselt külmaelemendiga kokku. Külmaelemendi ja pudeli vahele võib panna näiteks mingi riideeseme või ajalehe.

Säilitamine: hoiusta anumaid horisontaalselt, maksimaalselt 1 päev 15 kraadi juures. Soovitatav on kasutada röövlesti võimalikult kiiresti pärast toote saabumist, kuid mitte nt. keskpäevase kuumuse korral.

Tooted

10 000 röövlesta 0,5L pudelis

25 000 röövlesta 1L pudelis

Kahjurid:

ripslased, karilased

Kasutus:

kasuta puistatavaid röövlesti ainult siis, kui taimedel juba esineb või on teada, et sinna igal juhul ilmuvad kahjurid (nt. eelmised kultuurid on olnud nakatunud).

costRate:

100–250 röövlesta/m², ennetaval tõrjel korrata 1–2 nädala tagant

Taimekaitsetunnistus nõutav:

Ei

Tootja

Biotus Oy



biotus

<https://biotus.fi/>