

Aphelinus abdominalis

Kiletiivane parasitoid, keda kasutatakse peamiselt suurte lehetäiliikide tõrjeks. Sobib hariliku lehetäi (*Aulacorthum solani*) ja suure kartulilehetäi (*Macrosiphum euphorbiae*) tõrjeks, kuid parasiteerib mõnevõrra ka roosi-lehetäid (*Macrosiphum rosae*) ja virsiku lehetäid (*Myzus persicae*).

Tutvustus

Täiskasvanud *Aphelinus abdominalis* on 2–3 mm pikk. Emase rindmik on must ning tagakeha kollane, isane on üleni tume.

[Teave kasurite tellimise ja kaubale järele tulemise kohta.](#)

Toime

Aphelinus abdominalis on lehetäi siseparasiit, kuigi ta tõrjub lehetäisid ka neist toitudes. *Aphelinus abdominalis*’e elutsükkel kestab umbes 3 nädalat. Emased parasiteerivad 5–10 lehetäid päevas ja parasitoid levib mitme nädala jooksul. *Aphelinus abdominalis*’e populatsiooni kasv, levik kasvuhoones ja tõrjetulemuse ilmumine on aeglasem kui näiteks *Aphidius*’te kasutamisel. Parasiteeritud lehetäid muutuvad nädala jooksul mustaks, mitte pruunikaks ega vasevärvi nagu *Aphidius*’te poolt parasiteeritavad lehetäid. Uus parasitoid tuleb muumia seest välja, lõigates tagaossa rebenenud servaga augu.

Kasutamine

Parasitoid *Aphelinus abdominalis* tuleb leviku kiirendamiseks kasvuhoones ühtlaselt mitmes kohas laiali laotada. Kasurid kantakse otse saastunud kohtadesse, kuna nad ei levi taimestikust hästi edasi. *Aphelinus abdominalis* sobib kõige paremini kasutamiseks väikese lehetäide arvukuse korral ja tõrjet on soovitatav tõhustada *Aphidoletes aphidimyza*’ga.

Parasitoid *Aphelinus abdominalis* püsib taimestikust kauem aktiivsena kui teised lehetäide tõrjeks kasutatavad kasurid ning on vastupidavam suviste temperatuuridele, võrreldes teiste parasitoididega.

Aphelinus abdominalis **sobib kasutamiseks:**

dekoratiivtaimedel nagu krüsanteem, gerbera, roos

erinevatel köögiviljadel nagu tomat ja paprika

puukoolis

maitsetaimedel

Aphelinus abdominalis/ m2		Kordus
Ennetav tõrje	0,5–1 isendit/m2	Igal teisel nädalal
Kahjureid vähe	1–2 isendit/m2	Igal nädalal, kuni 80 % lehetäidest on parasiteeritud (parasiteeritud

	lehetäid on taimedel mustade mumiadena.
--	---

Transportimine ja säilitamine

NB! Kasureid tuleb transportida jahedas, vältides nende ülekuumenemist. Kui kodutee on pikem, tuleks kasutada termoskotti koos külmaelemendiga. Veenduge, et kasureid sisaldav pudel ei puutuks otseselt külmaelemendiga kokku. Külmaelemendi ja pudeli vahele võib panna näiteks mingi riideeseme või ajalehe.

Säilitamine: kuni 1–2 päeva temperatuuril 8–10 °C.

Tooted

Aphelinus abdominalis muumiad 100 tk/purk (kandeaaine: tatar ja vermikuliit)

Kahjurid:

harilik lehetäi, suur kartulilehetäi, roosi-lehetäid, virsiku lehetäid

costRate:

1–2 isendit/m², 1–2 nädala tagant

Kasutus:

kasvuhoones ühtlaselt mitmes kohas laiali laotada.

Taimekaitsetunnistus nõutav:

Ei

Tootja

Biotus Oy



<https://biotus.fi/>