

Boxer 800 EC

Boxer 800 EC on herbitsiid lühiealiste kõrreliste ja lühiealiste kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks talinisul, taliodral, talirukkil, talitritikalel, kartulil, hernel, põldoal, köömnel.

Toime

Toimeaine prosulfokarb imendub juurte ja lehtede kaudu ning liigub kiiresti kasvukuhikutesse. Prosulfokarb pidurdab lipiidide sünteesi, mille tulemusel rakkude elutegevus katkeb ja umbrohi hävineb.

Kasutamine

Talinisul, -rukkil, -tritikalel ja -odral kasutatakse peale külvi, enne tärkamist kuni esimene kõrvalvõrse on nähtav (BBCH 00–21). Tärkamiseelne pritsimine võib aeglustada kultuuri tärkamist, kuid mõju on ajutine ega mõjuta ebasoodsalt kultuuri saaki. Kasutada kuni umbrohtude 2. pärislehe faasini.

Vihmakindlus saabub 1 tund pärast pritsimist. Hooajal on lubatud pritsida üks kord.

NB! Mitte külvata uba 12 kuu jooksul pärast Boxer 800 EC-ga pritsimist.

Tärkamiseelne kasutamine teraviljadel

Kulunorm 3,0 l/ha.

Boxeri suhtes tundlikud umbrohud (efektiivsus > 85): rukki-kastehein (efektiivsus > 90%), murunurmikas, vesihein, roomav madar ehk virn, mailased, iminõgesed, raiheinad, aas-rebasesaba.

Keskmiselt tundlikud umbrohud (efektiivsus 60–85 %): kesalill, põldkannike.

Tärkamisjärgne kasutamine teraviljadel

Kasutada kuni teravilja 3 lehe faasini, kulunorm 3,0 l/ha.

Tundlikud umbrohud (efektiivsus > 85): rukki-kastehein (efektiivsus > 90%), murunurmikas, harilik hiirekõrv, põld-litterhein.

Keskmiselt tundlikud umbrohud (efektiivsus 60–85 %): roomav madar ehk virn, mailased, vesihein, raps võõrkultuurina.

Hariliku kesalille, vesiheina, põldmaguna, erilehise linnurohu **efektiivsemaks tõrjeks** võib kasutada paagisegu Boxer 800 EC 3,0 l/ha + Logran 20 WG 20 g/ha.

[Registri andmed](#)

[Ohutuskaart](#)

activeIngredient:

800 g/l prosulfokarb



Pakend:

20 l, emulsioonikontsentraat (EC)

costRate:

Kulunorm 3,0 l/ha

waterAmount:

200–400 l/ha

Taimekaitsetunnistus nõutav:

Ei

Tootja

Syngenta AG



<https://www.syngenta.ee/>