

Carnadine Extra

Carnadine Extra on kontaktse ja süsteemse toimega neonikotinoidne keemiline insektitsiid rapsil ja rüpsil, nisul, odral, tritikalel, talirukkil, suvikaeral, kartulil, kaalikal, õunapuudel, hernel (rohelisena ja täisküpsuses koristatav), porgandil, suhkrupeedil, söögipeedil, söödapeedil, aedoal, põldoal (värskelt ja kuivatatult), köömnel, pirnipuudel, peakapsal, lillkapsal, brokolil, valgeõielisel hiina brokolil, valgel peakapsal, punasel peakapsal, kähhar peakapsal, koonuskapsal, salatkressil, põldkännakul, rukolal, maitsetaimedel, söödavatel lilledel, harilikul portulakil ja lehtsinepil kahjurite tõrjeks.

Toime

Carnadine Extra on süsteemse ja osalise kontaktse toimega insektitsiid, mis kahjuri organismi sattudes kahjustab tema kesknärvisüsteemi. Kahjurid lõpetavad toitumise kohe pärast pritsimist, nende liigutused muutuvad koordineerimatuks ja nad surevad 1–2 päeva jooksul. Insektitsiid on ka tugeva translaminaarse toimega, levides pärast pritsimist läbi kogu taime.

Kasutamine

Laiendatud kasutusala väikese kasvupinnaga kultuuridele: kaalikas, porgand, suhkrupeet, söögipeet, söödapeet, aeduba, põlduba (värskelt ja kuivatatult), köömen, pirnipuudel, peakapsas, lillkapsas, brokoli, valgeõieline hiina brokoli, valge peakapsas, punane peakapsas, kähhar peakapsas, koonuskapsas, salatkress, põldkännak, rukola, lehtsinep, maitsetaimed, söödavad lilled, harilik portulak. NB! Kuna toode on laiendatud kasutamiseks eelmainitud kultuuridele professionaalse kasutaja taotluse alusel, vastutab toote tõhususe või fütotoksilisuse eest selle kasutaja.

Insektitsiidi Carnadine Extra on lubatud kasutada 1 kord hooaja jooksul. Pritsimisel vajalik vee kogus on rapsil, rüpsil, kartulil ja kaalikal 200–400 l/ha ning õunapuudel 500–900 l/ha.

Kuna toode tungib taime sisse väga kiiresti ja kui pihustatud lahus jõuab kuivada, siis ei mõjuta vihm preparaadi toimet.

Raps ja rüps

Varre-peitkärsakate (*Ceutorhynchus napi*, *Ceutorhynchus quadridens* ja *Ceutorhynchus pallidactylus*) tõrjeks pritsida kulunormiga 0,15–0,25 l/ha kasvufaasis BBCH 31–59 (lehtede ja kasvukuhiku vahe on suurem kui 5 cm kuni esimeste nuppude kroonlehed on värvunud).

Naeri-hiilamardika (*Meligethes aneus*) tõrjeks pritsida kulunormiga 0,18–0,25 l/ha kasvufaasis BBCH 50–60 (alates õiepungade moodustumise algusest kuni õitsemise alguseni).

Kõdra-peitkärsaka (*Ceutorhynchus obstrictus*) ning **kõdrasäase** (*Dasineura brassicaea*) tõrjeks pritsida kulunormiga 0,15–0,25 l/ha kasvufaasis BBCH 61–71 (alates kui esimesed pungad (10%) peavarre õisikus on avanenud kuni peavarre alumised kõdrad on täissuuruses, rohelised ja seemned on klaasjad).

Ooteaeg 28 päeva.

Kartul

Kartulimardika (*Leptinotarsa deceblineata*) tõrjeks pritsida kulunormiga 0,12–0,18 l/ha kasvufaasis BBCH 20–79 (alates pealsete arengu algusest kuni esimesed marjad on pudenenud).

Ooteaeg 7 päeva.

Õunapuud

Õunamähkuri (*Cydia pomonella*) tõrjeks pritsida kulunormiga 0,25 l/ha ning **õunapuu-lehetäi** (*Aphis pomi*) tõrjeks kasutada kulunormi 0,125 l/ha. Pritsida kasvufaasis BBCH 70 (alates viljade moodustumisest) kuni 14 päeva enne viljade koristamist.

Ooteaeg õunamähkuri tõrjumisel 28 päeva, lehetäi tõrjumisel 14 päeva.

Kaalikas

Virsi lehetäi (*Myzus persicae*), **oa-lehetäi** (*Aphis faba*), **peedi kärpse** (*Pegomya hyoscyami*) ja **kaalikärpse** (*Delia floralis*) tõrjeks pritsida kulunormiga 0,25 l/ha kasvufaasis BBCH 20–39 (alates kümnenda lehe või lehepaari lahti rullumisest kuni lehestik ja juurikas on saavutanud lõpliku suuruse). Vee kulunorm 200–400 l/ha.

Porgand

Porgandikärpse (*Psila rosae*) tõrjeks pritsida kulunormiga 0,15 l/ha kasvufaasis BBCH 12–39 (teisest lehest või kui lehepaar on 1cm pikkune kuni lehestik ja juurikas on saavutanud lõpliku suuruse). Vee kulunorm 200–400 l/ha.

Hoiatus! Mesilastele ja teistele tolmeldajatele ohtlik. Lubatud kultuure võib pritsida etiketil kinnitatud kasvufaasides ajavahemikus 22.00–05.00.

Dokumendid

[Registri andmed](#)

[Ohutuskaart](#)

activeIngredient:

atsetamipriid 200 g/l (17,6 %)

Pakend:

5 l, vees lahustuv kontsentraat (SL)

costRate:



0,18–0,25 l/ha sõltuvalt kultuurist ja kahjurist

waterAmount:

200–900 l/ha

Taimekaitsetunnistus nõutav:

Ei

Tootja

Nufarm Limited



<https://nufarm.com/>