

Cyperkill 500 EC

Cyperkill 500 EC on laia toimespektriga, pika järelmõjuga kontaktne insektitsiid nii põllu- ja aiakultuuridele kui dekoratiivtaimedele.

Toime

Cyperkill sobib kasutamiseks teraviljadel, rapsil, sinepil, linal, kartulil, juur- ja mugul-köögiviljadel, sibul-köögiviljadel, spinatil, kapsastel (ristõielistel köögiviljadel), liblikõielistel köögiviljadel, maisil, viinamarjal, dekoratiivtaimedel ja -puudel.

Paagisegud

Preparaati võib segada kõikide enamlevinud herbitsiidide, fungitsiidide ja insektitsiididega.

Dokumendid

[Registri andmed](#)

[Ohutuskaart](#)

Kasutamine

Kulunorm on sõltuvalt kultuurist 0,03–0,1 l/ha. Kõikide kultuuride puhul on soovitatav tööoode 5 päeva.

Hoiatus! Mesilastele ja teistele tolmeldajatele ohtlik. Keelatud kasutada õitsvatel põllumajanduskultuuridel ja umbrohtudel. Kui ei esine õitsvaid taimi, siis on lubatud kasutada ajavahemikus 22:00–05:00.

Teravili

Suvi-ja taliraps, sinep

Kartul

Mais

Pritsida kulunormiga 0,05–0,15 l/ha 1 kord hooaja jooksul. Viimane pritsimisaeg on BBCH 67 (täisõitsemiseni).

Lina

Hernes, uba, lupiin

*Rohelise herne ja rohelise oa puhul on ooteaeg 7 päeva.

Kapsad

Lillkapsas, brokoli, peakapsas, brüsseli kapsas

Juurviljad, juur-köögiviljad

Porgand, peet, kaalikas, naeris, redis, rõigas, mustjuur, mädarõigas, petersell, seller, spinat, pastinaak

*Ooteaeg on 14 päeva järgmiste kutluuride puhul: peet (suhkru-, looma- ja punapeet), kaalikas, naeris, lehtpeet.

Mugulsibul, küüslauk, porru, šalott

Spargel

Kasutada pärast saagi koristust kulunormiga 0,05 l/ha kuni 2 korda intervalliga 10 päeva.

Viinamari

Pritsida mähkurite või lehetäide ilmumisel kulunormiga 0,06 l/ha. Pritsida võib 1 kord hooaja jooksul, ooteaeg on 21 päeva.

Dekoratiivtaimed

Dekoratiivpuud

Kahjurid	Kulunorm, l/ha	Kasutamise aeg	Ooteaeg, p	Kordi
ripslased, maakirbud, viljakärbes, öölased	0,05	kasvuajal kahjurite ilmumisel	28	1
lehetäid	0,05	teravilja tärkamisest loomise alguseni	28	1

Kahjurid	Kulunorm, l/ha	Kasutamise aeg	Ooteaeg, p	Kordi	Intervall, p
hiilamardikad	0,05	enne õitsemist	49	2	14

maakirbud	0,05	tõusmete faasis	49	2	14
peitkärsakad	0,05	kui taime vars hakkab pikene-ma	49	2	14

Kahjurid	Kulunorm, l/ha	Kasutamise aeg	Ooteaeg, p	Kordi	Intervall, p
kartuli-mardikas, lehetäid	0,05–0,06	kasvuajal kahju-rite ilmumisel	7	2	10

Kahjurid	Kulunorm, l/ha	Kasutamise aeg	Ooteaeg, p	Kordi	Intervall, p
linakirp, ripslased, lina-tähtöölane	0,05	kahjurite ilmu-misel	49	2	14

Kahjurid	Kulunorm, l/ha	Kasutamise aeg	Ooteaeg, p*	Kordi	Intervall, p
hernekärsakad	0,05	tõusmete faasis	14	2	10
hernemähkur	0,05	herne õitsemise ajal	14	2	10
lehetäid	0,05	esimeste täikolooniate ilmumisel kuni õitsemise alguseni (BBCH 59)	14	2	10

Kahjurid	Kulunorm, l/ha	Kasutamise aeg	Ooteaeg, p	Kordi	Intervall, p
maakirbud, suur ja väike kapsal-iblikas, peitkär-sakad, kap-saöölane, kap-sakoi, lehe-vaablane, kap-	0,05		7	2	10

sakärbes, kap- sa-tuhktäi		kahjurite ilmu- misel			
------------------------------	--	--------------------------	--	--	--

Kahjurid	Kulunorm, l/ha	Kasutamise aeg	Ooteaeg, p*	Kordi	Intervall, p
lehetäid, maakirp	0,05		7	2	10
porgandikärbes	0,05	porgandikärb- se lendluse ajal	7	2	10
porgan- di-lehekirp	0,05	esimeste kahjustustun- nuste ilmunisel	7	2	10

Kahjurid	Kulunorm, l/ha	Ooteaeg, p	Kordi	Intervall, p
ripslased, sibulakoi	0,05	7	2	10

Kahjurid	Kulunorm, l/ha	Kordi	Intervall, p
lehetäid, leheröövikud, ripslased, lutikad, kae- vandikärbsed, kilptäid, mardikad, kärsakad jt	0,05-0,1	2	10

Kahjurid	Kulunorm, l/ha	Kordi	Intervall, p
lehetäid, leheröövikud, ripslased, lutikad, kae- vandikärbsed, kilptäid, mardikad, kärsakad jt	0,03-0,1	2	10

activeIngredient:

tsüpermetriin 500 g/l

Pakend:

1 l

costRate:

sõltuvalt kultuurist 0,03-0,1 l/ha

waterAmount:

200–300 l/ha

tankMixes:

preparaati võib segada kõikide enamlevinud herbitsiidide, fungitsiidide ja insektitsiididega.

Taimekaitsetunnistus nõutav:

Ei

Tootja

Arysta LifeScience