

Dr Green leheväetised

Vees lahustuvad ning kergesti imenduvad Dr Green leheväetised, mis sisaldavad õigetes kogustes taimedele vajalikke aminohappeid ja vitamiine.

Põhitoitaineid või mikroelemente sisaldavad väetised

Toime

DR GREEN-i väetised on väga efektiivsed tänu MicroActive™ ja MacroActive™ innovatiivsetele kompleksidele. Neis sisalduvad üksteist vastastikku täiendavad orgaanilised ühendid viivad toitained taimede poolt efektiivselt omastatavasse vormi. Kompleksid sisaldavad ka õigetes kogustes taimedele vajalikke aminohappeid ja vitamiine, avaldades positiivset mõju mitmetele tähtsatele protsessidele ja funktsioonidele taime sees.

Toiteelementide sisaldus, g/kg

Toiteelementide sisaldus, g/kg

Toode	SO3	MgO	B	Cu	Fe	Mn	Mo	Zn	Kokku B...Zn
DR GREEN TERAV- ILI	280,0	9,0	5,0	50,0	60,0	80,0	0,5	20,0	215,5
DR GREEN RAPS	145,0	5,0	100,0	2,0	25,0	50,0	0,5	20,0	197,5
DR GREEN KARTUL	250,0	20,0	5,0	2,0	60,0	70,0	0,5	80,0	217,5
DR GREEN MAIS	250,0	20,0	5,0	2,0	60,0	70,0	0,5	80,0	217,5

DR GREEN KÖÖ- GIVIL- JAD	250,0	45,0	5,0	5,0	80,0	50,0	0,5	50,0	190,5
--------------------------------------	-------	------	-----	-----	------	------	-----	------	-------

Toode	N (üld)	P2O5	K2O	Kokku N-P-K
DR GREEN START (12N-60P)	120,0	600,0	–	720,0
DR GREEN ENERGY (10N-40K)	100,0	–	400,0	500,0
DR GREEN QUALITY (50P-34K)	–	500,0	340,0	840,0

Kasutamine

Dr Green Teravili

Teraviljad: 2 kg/ha kevadel kõrsumise alguseni ja 1 kg/ha kõrsumise ajal.

Dr Green Raps

Hoolikalt valitud koostis katab rapsi mikrotoitainete vajaduse. Väetises olev boor vastutab juuresüsteemi õige arengu eest, mõjutab tolmlmist ja viljastumist ning suurendab kõtrade ja seemnete arvu. Mangaan toetab lämmastiku ainevahetuse protsesse taimes, mõjutab fotosünteesi, suurendab külmakindlust. Väävlisisaldus suurendab lämmastiku kasutamist.

Raps: 2 kg/ha kevadel varsumise lõpuni ja õiepungade moodustumise ajal.

Dr Green Kartul

Peavarre moodustumise ajal 1–2 kg/ha, reavahede kokkukasvamise ajal 1–2 kg/ha ning õitsemise ajal 1 kg/ha.

Dr Green Köögiviljad

Tomat, pipar, kurk: 2–4 väetamist kulunormiga 1–3 kg/ha. Esimene ja teine väetamine intensiivse vegetatiivse kasvu faasis, iga 7–14 päeva järel. Kolmas väetamine enne õitsemist ja neljas viljade valmimise ajal.



Kapsad: 2–3 väetamist kulunormiga 1–3 kg/ha. Esimene väetamine 2–3 nädalat pärast taimede istutamist, teine ja kolmas väetamine 10–14 päeva möödudes.

Dr Green Mais

Maisi soovitatakse väetada 2–3 korda kulunormiga 1–4 kg/ha. Esimest korda väetada 2–6 lehe faasis, teist korda 8–10 lehe faasis ning kolmas väetamine 12 lehest kuni pööriste tekkimiseni.

Dr Green Start

Teraviljad: 1 kg/ha kevadel kõrsumise alguseni
Raps: 1 kg/ha kevadel varsumise lõpuni
Kartul: 0,5–2 kg/ha peavarre moodustumise ajal

Dr Green Energy

Teraviljad: 1 kg/ha kõrsumise ajal
Raps: 2 kg/ha õiepungade moodustumise ajal
Kartul: 0,5–2 kg reavahede kokkukasvamise ajal

Dr Green Quality

Teraviljad: 1–2 kg/ha loomise ja õitsemise ajal
Raps: 0,5–2 kg/ha kõtrade arengu ja küpsemise faasis
Kartul: 0,5–2 kg õitsemise ajal

Dokumendid

[Kataloog](#)

Etiketid: [Boorhape](#), [Energia](#), [Kartul](#), [Kvaliteet](#), [Köögiviljad](#), [Mais](#), [Peet](#), [Start](#), [Teravili](#), [Viljapuuaiad](#), [Raps](#)

Pakend:

12 kg

Koostis:

MicroActive™ ja MacroActive™ kompleksid, amino-
happed, vitamiinid

costRate:

Dr Green Start, Energy ja Quality 0,5–2 kg/ha, teised
väetised 1–4 kg/ha

Taimekaitsetunnistus nõutav:

Ei

Tootja

Dr. Green sp. z o. o.

