

Estet 600 EC

Estet 600 EC on laia toimespektriga selektiivne herbitsiid ühe- ja mitmeaastaste kaheiduleheliste umbrohtude tõrjumiseks tali- ja suviteraviljades, rohu- ja karjamaadel ning maisipõllul.

Estet 600 EC on laia toimespektriga selektiivne herbitsiid ühe- ja mitmeaastaste kaheiduleheliste umbrohtude tõrjumiseks tali- ja suviteraviljades, rohu- ja karjamaadel ning maisipõllul.

Toime

Estet 600 EC on selektiivne herbitsiid, mis tõrjub efektiivselt paljusid ühe- ja mitmeaastaseid kaheidulehelisi umbrohtusid. Preparaat mõjub süsteemselt ning toimib kui auksiini-tüüpi herbitsiid. Toimeained tungivad kiiresti taimesse ning esmased kahjustustunnused ilmnevad varsti pärast pritsimist taimede deformeerumise näol. Umbrohud hävivad täielikult 14–21 päeva pärast pritsimist.

Väga hea mõju: tähkjas rebashein, harilik malts, valge hanemalts, harilik hiirekõrv, rukkilill, põld- ja tuliohakas, harilik kassitapp, kurereha, kukemagun, süstlehine ja suur teeleht, portulak, põldrõigas, põldsinep, harilik piimohakas, põld-piimohakas, harilik võilill, põld-litterhein, valge ristik, harilik hiirehernes.

Hea mõju: harilik raudrohi, põld-varsapõlv, põld-varesjalg (põld-kukekannus), harilik punand, kare kõrvik, paljas võõrkakar, kurereha, põld-lõosilm, erilehine linnurohi, konnatatar, harilik kirburohi, kahar kirburohi, roomav tulikas, ristirohi, harilik ristirohi, harilik nälghein, must maavits.

Nõrk mõju: valge karikakar, verev iminõges, lõhnav kummel, põldmünt, oblikad, vesihein, paiseleht, kõrvenõges, pärsia mailane, kannikesed.

Kasutamishend

Herbitsiid toimib aktiivselt kasvavatele umbrohtudele. Mitmeaastaste umbrohtude tõrjumisel saavutatakse parim toime umbrohtude varajase arengu faasis ja/või rosetifaasis.

Töölahuse kulu: 100–300 l/ha kultuuri tavalise tiheduse korral, 300–400 l/ha tiheda taimikuga põldudel.

Hooajal on lubatud pritsida 1 kord.

Paagisegud

Estet 600 EC-d võib segada teiste herbitsiidide, fungitsiidide, insektitsiidid, kasvuregulaatorite ja vedelväetistega. Toimespektri laiendamiseks võib Estet 600 EC-d vajadusel kasutada koos muude herbitsiididega.

Kultuur	Kulunorm, l/ha	Pritsimise aeg
Taliniisu, rukis, tritikale	0,5 – 1,0	4 lehe faasist võrsumise lõpuni (BBCH 14–32).
Suvinisu, oder, kaer	0,5 – 1,0	2 lehe faasist võrsumiseni (BBCH 14–32).

Mais	0,5	Enne kui maisil areneb välja 6 lehte.
Kõrrelised heintaimed seemneks	1,0 – 2,0	Võrsumise algusest kuni kõrsumise lõpuni (BBCH 21–41), kui mitmeaastased kaheidulehelised umbrohud on rosetifaasis.
Karjamaad (ilma liblikõieliste heintaimedeta)	1,0 – 2,0	Võrsumise algusest kuni kõrsumise lõpuni (BBCH 21–41), kui mitmeaastased kaheidulehelised umbrohud on rosetifaasis.

Toimeaine	2,4-D 600 g/l
Pakend	10 l emulsioonikontsentraat
Tootja	Nufarm

[Registri andmed](#)

[Ohutuskaart](#)

activeIngredient:

2,4-D 600 g/l

Pakend:

10 l emulsioonikontsentraat

costRate:

0,5 – 2,0 l/ha sõltuvalt kultuurist ja umbrohtude faasist

Taimekaitsetunnistus nõutav:

Ei

Tootja

Nufarm Limited



<https://nufarm.com/>