

Fenix

Fenix on üheaastaseid kaheidulehelisi ja mõnesid kõrrelisi umbrohte tõrjuv herbitsiid kartuli, porgandi, tippsibula, herne, põldoa, köömne, kanep, pastinaagi, juur- ja lehtselleri, lehtpeterselli, tilli, küüslaugu ja päevalille põldudele, männi, kuuse ja lehise istandustes ja puukoolis.

Toime

Fenix on laia toimespektriga kontaktne herbitsiid kaheiduleheliste ja mõnede kõrreliste umbrohtude tõrjeks. Pritsituna põllule, jätab toimeaine mulla pinnale õhukese kileja kihi ning seetõttu hävivad ka hiljem tärkavad umbrohud.

Kasutamine

Et saavutada parimat tõrjetulemust, soovitatakse Fenix'it pritsida enne umbrohtude tärkamist või nende väga varases kasvustaadiumis – umbrohtude idanemisel kuni esimeste pärislehtede ilmuniseni. Erandiks on suure orgaanilise aine sisaldusega mullad – sel juhul on parim aeg pritsida vahetult pärast umbrohtude tärkamist. Preparaati ei ole lubatud kasutada samal põllualal kaks aastat järjest. Fenix'i kõrval tuleks kasutada herbitsiide, mis ei kuulu kemikaalide gruppi F3, et vältida resistentsuse tekkimist. Herbitsiidi ei soovitata kasutada seemnest külvatud sibula põldudel, kuna jaheda ja niiske ilma korral võib pritsimine kultuurile ebasoodsalt mõjuda.

Kultuurid	Kulunorm, l/ha	Kasutuspiirang	Pritsimise aeg
Kartul	2,5 – 3,0	1 kord kasvuperioodis	Peale kartuli maha-panekut või peale viimast vaheltharimist, kuid mitte hiljem kui üks nädal enne tärkamist.
Hernes, põlduba	3,0	1 kord kasvuperioodis	Peale külvi, kuid mitte hiljem kui 1 nädal enne herne tärkamist.
Porgand, küüslauk, juurseller, pastinaak	2,5	1 kord kasvuperioodis	Peale külvi, kuid enne kultuuri tärkamist
või	1,5 + 1,0	2 korda kasvuperioodil	1. pritsimine peale külvi, kuid enne kultuuri tärkamist ja 2. pritsimine, kui kultuuril on arenenud 2 pärislehte ja uued umbrohud on tärganud.
Tippsibul	2,5	1 kord kasvuperioodis	

			Kasvuperioodil peale külvi, kuid enne kultuuri tärkamist
või	1,5 + 1,0	2 korda kasvuperioodil	1. pritsimine peale külvi, kuid enne kultuuri tärkamist ja 2. pritsimine, kui kultuuril on arenenud 1–2 lehte ja uued umbrohud on tärganud.
Lehtseller, lehtpetersell	2,5	1 kord kasvuperioodis	Peale külvi, kuid enne kultuuri tärkamist.
Köömen, kanep	2,0	1 kord kasvuperioodil	Peale külvi, kuid enne kultuuri tärkamist.
Till	2,0 – 3,0	1 kord kasvuperioodis	Peale külvi, kuid enne kultuuri tärkamist.
Päevalill	2,5 – 3,0	1 kord kasvuperioodis	Peale külvi, kuid mitte hiljem kui 1 nädal enne päevalille tärkamist.
Puukoolid	2,0 – 3,0	1 kord aastas	Kuuse, männi ja lehise istandustes ning puukoolides talve lõpul/varakevadel, enne pungade puhkemist.

Dokumendid

[Registri andmed](#)

[Ohutuskaart](#)

activeIngredient:

aklonifeen 600 g/l

Pakend:

5 l, suspensioonikontsentraat

costRate:

2,0 – 3,0 l/ha

waterAmount:





200–300 l/ha sõltuvalt pritsimistingimustest

Taimekaitsetunnistus nõutav:

Ei

Tootja

Bayer AG

