

Fertiplus Liquid 7-2-2

Fertiplus Liquid 7-2-2 on orgaaniline vedelväetis, mis sobib kõikide kultuuride lehe- ja kastmisväetamiseks.

N-P-K 7-1-1,7 mikroelemendid ja aminohapped

Toime

Fertiplus Liquid 7-2-2 on eriti efektiivne taimede kiire vegetatiivse kasvu perioodil. Väetises on suurepärases kombinatsioonis kiiresti ja aeglaselt vabanev lämmastik. Tänu sellele stimuleerib vedelväetis taimede tervist ja mulla elustikku rohkem kui kolme nädala jooksul.

Toode sisaldab makro- ja mikroelemente, huumushappeid ning 21% aminohappeid, millest 13 % on L – vormis.

Väetist saab kasutada taimede kastmise teel või tilkkastmissüsteemi kaudu, kuid kõige tõhusam viis on lehtede kaudu väetamine.

Fertiplus Liquid 7-2-2 toimib kõige paremini, kui seda kasutatakse põllukultuuri jaoks otsustava kasvu-perioodi alguses või selle ajal. Perioodidel, mil taim vajab kõrgemat lämmastikuisaldust, on see väetis suurepärane valik taimedele lisaenergia andmiseks ja kasvu kiirendamiseks.

Väetis sisaldab 13% vabu aminohappeid, mis on taimede poolt kergesti omastatavad ja kasutatavad lämmastikuallikana. Aminohapped on kergesti kättesaadavad ja erinevalt anorgaanilisest lämmastikust (NO₃) saab taim neid aminohappeid kasutada koheselt valkude ehitusplokkidena.

Eelised:

- Väetis ja biostimulaator ühes tootes
- Lehtede kaudu väetades annab kiire lämmastiku efekti
- Hinnaliste mineraalide väiksem leostumine
- Kiiresti kättesaadavad toitained
- Parandab mulla elustikku
- Paremini stressile vastupidamisvõime ja taastumine abiootilisest stressist

Nõuanne:

- Soovitav on kasutada väetist perioodidel, kui põllukultuur vajab taganttõuget, nagu:
- Kasvu- ja juurperioodi alguses
- Abiootilise stressi perioodil
- Olulistel momentidel kasvu ajal
- Stimuleerib vegetatiivset kasvu, nõrgestamata taimi.

Kasutamine

- * Lehtede kaudu väetades on vee kogus 150 –300 l/ha.
- * Kastmisel on soovitatav väetislahuse kontsentratsioon 0,2 %.
- * Täpne kasutusnorm sõltub mulla- ja ilmastikutingimustest

Toode tuleb ära kasutada 4 kuni 6 tundi pärast töölahuse valmistamist. Puhasta pritsipaak enne ja pärast kasutamist, kui kasutad seda lehtede kaudu väetamiseks.

*Taimede poolt omastatavad L-vormis aminohapped.

pH: 5,5–6,0

Kultuur	Kasutusmäär	Kasutamise aeg	Bioloogiline toime
Köögiviljad ja marjad	Lehe kaudu: 3–5 l/ha Kastmine: 5–10 l/ha	Kohe pärast seemikute istutamist, korrata 7 päeva pärast ja siis korrata iga 15–20 päeva tagant enne õitsemist	Rikkalikum õitsemine ja viljade moodustumine ning palju ühtlasem saak varajase toodangu puhul
Kartulid	Lehe kaudu: 3–5 l/ha Kastmine: 5–10 l/ha	Alusta, kui taimed on u 15 cm kõrged ning korda iga 20–25 päeva tagant	Suurenenud saagikus ja palju ühtlasem mugula suurus
Söödakultuurid	Lehe kaudu: 2–4 l/ha	Iga 3–4 nädala tagant	Lühem kasvutsükel, juurte taastumine ja suurem biomass
Teraviljad	Lehe kaudu: 2–4 l/ha	Tähtsate kasvufaaside ajal, nt ohteotste ilmumine, õite moodustumine, enne stressi või selle ajal	Parem vastupidavus abiootilisele stressile, parem kasv kevadel ja pestitsiidide suurem efektiivsus
Viljapuud	Lehe kaudu: 3–5 l/ha Kastmine: 5–10 l/ha	Iga 15–20 päeva tagant, alusta enne õite moodustumist	Parem õite moodustumine, viljade suurus ja kaal ja defitsiidi korrigeerijate parem imendumine
Ilutaimed	Lehe kaudu: 3–5 l/ha Kastmine: 5–10 l/ha	Iga 14 päeva tagant	Tugevamad taimed, parem lehtede ja õite värvus

Seemikud	Lehe kaudu ja kastmine: 200 ml/1000m ²	Iga 14 päeva tagant kuni istutamiseni	Tervemad taimed ja parem juure areng
Viinamarjad	Lehe kaudu: 3–5 l/ha Kastmine: 5–10 l/ha	Väeta õitsemise ajal, pärast õitsemist ja viljade kasvu alguses	Kiirendab vegetatiivset kasvu ilma taime nõrges- tamata. Parema lehtede ja õite värvus, viljade üht- likkus ja suhkrute sisal- dus.
Abiootilise stressi leeven- damine	Lehe kaudu: 3–5 l/ha*	Kasuta igasuguse stressi puhul. Korda iga 7 päeva tagant kuni stressiperioo- di lõpuni	Suurendab stressitaluvust tänu aminohapetele
Kõik kultuurid	Lehe kaudu: 1–2 l/ha	Lisa taimekaitsevahen- ditele	Vähendab taimekaitse- vahendite negatiivset mõju taimedele

Fertiplus Liquid 7–2–2 aminogramm +21% aminohappeid (13% L-vormis aminohappeid)			
Ananiin	15,4 g/kg	Leutsiin	<0,5 g/kg
Alginiin	1 g/kg	Lüsiin	0,7 g/kg
Asparagiinhape	22,9 g/kg	Metioniin	<0,5 g/kg
Tsüstiin	<0,5 g/kg	Fenüülalaniin	<0,5 g/kg
Glutamiin	50 g/kg	Proliin	29,7 g/kg
Glütsiin	0,7 g/kg	Seriin	0,9 g/kg
Histidiin	<0,5 g/kg	Tauriin	0,7 g/kg
Hüdroksüproliin	<0,5 g/kg	Türosiin	0,5 g/kg
Isoleutsiin	1,1 g/kg	Valiin	1,1 g/kg

Koostis

Toitainete sisaldus massiprotsentides

+21% aminohappeid

**Orgaanilise päritolu tõttu võib esineda kõrvalekaldeid kuni 15%.*

Toitaine	Massi%
Lämmastiku (N) üldsisaldus	6,8
Fosforpentaoksiid (P ₂ O ₅)	2,2
Kaaliumoksiid (K ₂ O)	2
Aminohappeid kokku	21
Taimede poolt omastatavaid L-vormis aminohappeid	13
Orgaaniline aine	50,9
Magneesiumoksiid (MgO)	0,2
Kaltsium (Ca)	0,2
Vääveltrioksiid (SO ₃)	4,3
Mikroelemendid	Fe, Zn, B, Mn, Cu, Mo

Paagisegud

Toode sobib kokku enamike tavakasutuses olevate väetiste ja taimekaitsevahenditega. Mitte segada vaske sisaldavate väetistega, väävlil põhinevate toodetega, aluseliste või õlibaasil toodetega.

Transport ja hoiustamine

Hoia toodet kuivas, külmavabas kohas eemal otsesest päikesevalgusest. Suurte ja/või ootamatute temperatuuri muutuste ajal võivad moodustuda kristallid.

Toode ei sisalda säilitusaineid, mis võib põhjustada ebastabiilsust säilitamise (pikaajalise) ajal. Loksuta või sega enne kasutamist, et vältida paksenemist.

Dokumendid

[Ohutuskaart](#)

Pakend:

20 l

Koostis:

lämmastiku (N) üldsisaldus 6,8%; P 0,96%; K 1,7%;
aminohappeid kokku 21%; orgaaniline aine 50,9%;
mikroelemendid: Fe, Zn, B, Mn, Cu, Mo.



costRate:

leheväetamisel 1–5 l/ha, kastmisväetamisel 5–10 l/ha

Taimekaitsetunnistus nõutav:

Ei

Tootja

Den Ouden Groep