

Flight Forte

Flight Forte herbitsiid taliteraviljadel kaheiduleheliste ja kõrreliste umbrohtude tõrjeks.

Toime

Toimeaine pendimetaalin imendub peamiselt juurte kaudu ja blokeerib raku jagunemise, mistõttu taime pikkuskasv ja juurte arenemine peatub. Peale pritsimist ja enne suremist muutuvad tundlikud taimed üldiselt tumerohelisemaks ja kompaktsemaks.

Toimeaine pikolinafeen imendub läbi lehtede ja juurte, tõkestades karotenoidide biosünteesi. Karotenoidid väldivad valgese klorofüllil lagundamist ja kui see kaitse on pikolinafeeni kasutamisega eemaldatud, on tulemuseks lehtede pleekimine.

Flight Forte on efektiivne mitmetele kaheidulehelistele ja lisaks ka kõrreliste umbrohtudele. Flight Forte omab eriti tugevat mõju põldkannikesele, murunurmikale ja liikidele, mis kuuluvad kareleheliste sugukonda, nagu põld-lõosilm.

[Registri andmed](#)

[Ohutuskarta](#)

Kasutamine

Kaheiduleheliste umbrohtude (sh isekülvanud rapsi) tõrjumiseks taliteraviljadel pritsida kulunormiga 1,5–2,5 l/ha. Murunurmika esinemisel kasutada kulunormi 2,0–2,5 l/ha. Flight Fortet tuleb kasutada sügisel taliteraviljade tärkamise kasvufaasis 11–13 (arenenud on 1. kuni 3. leht). Parim tulemus saadakse varasel pritsimisel piisava mullaniiskuse korral.

Kuigi niiske muld suurendab efektiivsust, tuleb Flight Fortet alati kasutada **varakult kasvuhooaja alguses**, sõltumata mulla niiskusest. Flight Forte valguse käes ei lagune, mistõttu toode töötab endiselt ka pärast kuiva perioodi. Kuna preparaat imendub põhiliselt juurte kaudu, võib pritsimist teha niiskel perioodil. Kui Flight Fortet kasutatakse koos teiste herbitsiididega, on tähtis kontrollida segupartnerite nimekirja seoses pritsimise järgse vihmakindluse ajaga.

Lubatud on pritsida 1 kord kasvuhooaja jooksul.

Flight Forte efektiivsus võib väheneda suure orgaanilise aine sisaldusega muldades, kuna orgaanika võib toimeained siduda. Suur kogus põhku võib põhjustada toote ebaühtlast jaotumist ja seetõttu ebaühtlast umbrohu tõrjet.

Paagisegud

Flight Fortet võib segada Boxer 800 EC ja mikrotoitainetega.

activeIngredient:

pendimetaalin 320 g/l (28,8% kaalust), pikolinafeen 16 g/l (1,4% kaalust)



Pakend:

10 l, suspensioonikontsentraat

waterAmount:

150–300 l/ha

costRate:

1,5–2,5 l/ha

Taimekaitsetunnistus nõutav:

Ei

Tootja

BASF A/S

