

Folicur

Folicur on laia toimespektriga süsteemne fungitsiid suvi- ja talinisu, suvi- ja taliodra, rapsi ja rüpsi seenhaiguste tõrjeks, samuti rapsi ja rüpsi kasvu reguleerimiseks.

Toime

Folicur on laia toimespektriga süsteemne fungitsiid. Toimeaine tebukonasool omastatakse taime vegetatiivosade poolt ühe tunni jooksul ning preparaat on seejärel vihmakindel. Fungitsiid mõjub nii profülaktiliselt kui ravivalts ning kaitseb taimi mitme nädala vältel.

Kasutamine

Parima tulemuse saavutamiseks pritsitakse haiguse varajases arengustaadiumis, profülaktiliselt. Pritsitakse hommiku- ja õhtutundidel, kui mesilaste ja teiste kasulike putukate lendlus on lõppenud. Folicur kaitseb tõhusalt ka pähikule lööbivate fusarioositüvede eest. Toodet on lubatud kasutada taimede õitsemise ajal.

Teravili

Kulunorm on kõikidel teraviljadel 0,75 – 1,0 l/ha.

Raps, rüps

Haiguste tõrjeks on Folicuriga lubatud teha kuni 2 pritsimist hooaja jooksul.

- Talirapsi ja –rüpsi pritsimisel sügisel – kulunorm 0,5 l/ha.
- Tali- ja suvirapsi ning –rüpsi pritsimisel kevadel ja/või suvel – kulunorm 1,0 l/ha.

Pritsimise aeg sõltub tõrjutavast haigusest.

Rapsi ja rüpsi kasvu reguleerimine

Fungitsiid on rapsil ja rüpsil kasutatav ka kasvuregulaatorina. Rapsi ja rüpsi on kasvu reguleerimiseks lubatud kasvuperioodi jooksul pritsida kuni 2 korda.

Haigus	Kulunorm, l/ha	Pritsimise aeg	Kordi	Ooteaeg, p
	0,75 – 1,0	vahemikus õitsemise algusest kuni õitsemise keskpaigani	1	35

Teravilja seenhai- gused		vastavalt haiguse lööbimise riskile.		
-----------------------------	--	---	--	--

Haigus	Pritsimise aeg	Ooteaeg, päev
Valgemädanik <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> ja hahkhallitus (<i>Botrytis cinerea</i>)	Pritsitakse tavaliselt rapsi õitsemise keskel, kui esimesed rapsi kollased õielehed hakkavad langema.	56
Kuivlaikus <i>Alternaria brassicae</i>	Esimeste haigustunnuste ilmunisel alates rapsi 4 lehe faasist kuni täisõitsemiseni. Kõtrade kaitseks on parim aeg pritsida õitsemise ajal.	56
Tsülinndrosporioos (<i>Pyrenopeziza brassicae</i>) ja fomoos (<i>Leptosphaeria maculans</i>) e mustmädanik	Pritsitakse esimeste haigustunnuste ilmunisel alates rapsi 4 lehe faasist kuni õitsemise alguseni. Fomoosi tõrjumiseks talirapsil ja -rüpsil on põhiline tõrjeaeg sügisel, alates rapsi nelja lehe faasist.	56

Kultuur/ aeg	Kasvufaas	Kulunorm, l/ha	Ooteaeg, p
Taliraps, talirüps			
Sügis	5 – 6 lehte	0,5	
Kevad	30 – 50 cm	1,0	56
Suviraps, suvirüps			
Kevad	30 – 50 cm	1,0	56

Dokumendid

[Registri andmed](#)

[Ohutuskaart](#)

activeIngredient:

tebukonasool 250 g/l

Pakend:

5 l, emulsioon, õli vees

costRate:

0,75–1,0 l/ha teraviljadel; 0,5–1,0 l/ha rapsil ja rüpsil

waterAmount:

200–400 l/ha

Taimekaitsetunnistus nõutav:

Ei

Tootja

Bayer AG

