

Fornet Max 6 OD

Fornet Max 6 OD on herbitsiid lühi- ja pikaealiste kõrreliste ning kaheiduleheliste umbrohtude tärkamisjärgseks tõrjeks maisil.

Toime

Fornet Max 6 OD on väga efektiivne sulfonüül-uurea herbitsiid, mis sisaldab toimeainena nikosulfurooni. Fornet Max 6 OD imendub peamiselt lehe kaudu, mulla kaudu imendumine on piiratud. Umbrohtude kasv peatub kiiresti ja efektiivselt. Pritsitud taimed muudavad värvi kuni hävimiseni 10–20 päeva jooksul pärast pritsimist.

Hea kuni suurepärane mõju: harilik rukkihein, murunurmikas, itaalia raihein, tuulekaer, liiv-paelhirss, tähk-kukehirss, kukeleib, harilik orashein, tähkjas rebashein, harilik hiirekõrv, kare kõrvik, üheaastane seljarohi, põld-lõosilm, vesi-kirbutatar, põld-litterhein, põldkannike, paljuseemneline hanemalts, verev iminõges, vesihein, harilik kirburohi.

Mõõdukas kuni hea mõju: valge hanemalts, must maavits.

Kasutamine

Fornet Maxi kasutatakse maisil 2 kuni 8 lehe faasis (BBCH 12–18). Kulunorm on 0,75 l/ha. Jaotatud pritsimine teha kulunormiga 0,5 l/ha maisi 2–3 lehe faasis + 0,25 l/ha 5–8 lehe faasis. Vihmakindlus saabub 6 tundi pärast pritsimist. Pritsimiste intervall 10–14 päeva.

Lühiealiste kõrreliste tõrjeks pritsitakse umbrohtude 2 lehe kuni varase võrsumise faasis, **pikaealisi kõrrelisi** 4–6 lehe faasis ja kaheidulehelisi 2–6 lehe faasis.

Paagisegus pritsimisel võib kasutada väiksemat kulunormi lubatud kulunormi piires, olenevalt teiste toodete toimespektrist.

Tähelepanu

- Samal põllul ei tohi kasutada Fornet Max 6 OD-d ja kloororgaanilist insektitsiidi.
- Fornet Maxi ei tohi kasutada, kui põldu on eelnevalt pritsitud fosfororgaanilise, juurte kaudu toimiva insektitsiidiga.
- Põhjavee kaitsmiseks ei tohi nikosulfurooni sisaldavat toodet kasutada samal põllul tihedamini kui 1 kord 2 aasta jooksul.

Soovitav on pritsida lubatud kulunormiga heas kasvujõus taimi. Stressis maisi ei tohiks pritsida, sest see võib kultuuri kahjustada. Teatud tingimustel võivad maisi lehed 1–2 nädalat pärast pritsimist ajutiselt kolletuda. See nähtus on mööduv ega avalda saagile mõju.

Paagisegud

Mitte kasutada segus lehe- või vedelväetistega.

Dokumendid



Registri andmed

Ohutuskaart

activeIngredient:

60 g/l nikosulfuroon

Pakend:

5 l, õlispersioon

costRate:

0,75 l/ha; jaotatud pritsimine 0,5 l/ha + 0,25 l/ha

waterAmount:

200–400 l/ha

Taimekaitsetunnistus nõutav:

Ei

Tootja

ISK Biosciences