

Goltix Gold

Goltix Gold on laia toimespektriga herbitsiid kaheiduleheliste ja mõningate üheiduleheliste umbrohtude tõrjeks suhkruppeedil, söödapeedil, punapeedil, taimlates, dekoratiivtaimedel, metsanduses, maasikatel, köömnel, seemneks kasvatataval spinatil ning peiulilledel.

Toime

Toimeaine metamiitroon pärsib fotosünteesi fotosüsteemis II. Metamiitroon mõjub nii mulla kui ka lehtede kaudu. Enamasti imendub taimekaitsevahend juurte kaudu, kuid mõju avaldub ka lehtede kaudu, misjärel levib preparaati taimes laiali.

Kasutamine

Toode on mõeldud külvieelseks ja külvijärgseks ühe- ja kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks.

Suhkru-, sööda- ja punapeet

Kulunorm pritsimiskorra kohta 0,5–2,0 l/ha. Kulunorm tärkamiseelselt: 0,5–2 l/ha. Tärkamisjärgselt: 0,5–1 l/ha. Maksimaalne kulunorm hooaja jooksul kokku on 3 l/ha. Pritsimiskordade arv 1–4. Minimaalne pritsimiskordade vaheline intervall 7 päeva. Veekogus 200–400 l/ha.

Tärkamiseelselt võib pritsida kultuurtaime külvist kuni idanemise lõpuni, tärkamisjärgselt idulehtede ilumisest maapinnale kuni 8 leheni. Maksimaalselt on lubatud pritsida 4 korda hooaja jooksul: 1× tärkamiseelselt + 3× tärkamisjärgselt või 4× tärkamisjärgselt.

Taimlad ning ilupuud ja põõsad

Kulunorm taimlates (ilutaimed ja puukultuurid) pritsimiskorra kohta 2,0 – 3,0 l/ha, ilupuudel ja põõsastel 3,0 l/ha. Veekogus 200–400 l/ha. Pritsitakse, kui taimed on puhkeajas või varjestatud pihustamine ridade vahele. Pritsimiskordade arv 1.

Metsataimla kuusk (*Picea abies*)

Kulunorm pritsimiskorra kohta 1,0 l/ha. Maksimaalne kulunorm hooaja jooksul on 3 l/ha. Pritsimiskordade arv 1–3. Minimaalne pritsimiskordade vaheline intervall 7 päeva. Veekogus 150–400 l/ha.

Pritsimise aeg: aprill–mai, august–oktoober.

Köömen (külviaastal)

Kulunorm pritsimiskorra kohta 0,75–1,5 l/ha. Pritsimiskordade arv 1–2. Minimaalne pritsimiskordade vaheline intervall 14 päeva. Veekogus 200–400 l/ha. Maksimaalne kogus hooaja jooksul on 3 l/ha.

Aprill–august/esimene töötuskord külvist kuni iduvarre kasvamiseni mullapinnani. Teine töötuskord esimesest pärislehest kuni üheksa pärisleheni esimesel kasvuaastal.

Viimane pritsimisaeg on augusti lõpp, pritsida kui umbrohud on maksimaalselt kasvufaasis BBCH 12 (kuni 2 pärislehte või pärislehepaari on lahti rullunud).

Kulunorm ühekordsel pritsimisel on 2,0 l/ha. Pritsimise aeg on aprill–august, esimesest pärislehest kuni üheksa pärisleheni esimesel külviaastal.

Köömen (koristusaastal)

Kulunorm pritsimiskorra kohta 0,75–1,5 l/ha. Pritsimiskordade arv 1–2. Minimaalne pritsimiskordade vaheline intervall 7 päeva. Veekogus 200–400 l/ha. Maksimaalne kogus hooaja jooksul on 3 l/ha.

Mai/mai koristusaastal; jaotatud pritsimine enne peavarre pikkuskasvu, maksimaalseks kõrguseks 15 cm maikuu jooksul.

Viimane pritsimisaeg on kui umbrohtudel on kuni 2 pärislehte või pärislehepaari on lahti rullunud.

Ooteaeg tuleneb pritsimise ajast: mai lõpus pritsimise korral tohib koristada alles juuli lõpus.

Maasikas, äsja istutatud põllul

Pritsimiskordade arv 1. Kulunorm pritsimiskorra kohta 1,75 l/ha. Veekogus 200–300 l/ha. Pritsimise aeg: aprill–juuni. Pritsimine 14 päeva pärast istutamist, kuid enne õitsemist.

Pritsimiskordade arv 1–3. Kulunorm pritsimiskorra kohta 0,5–1,0 l/ha. Veekogus 200–300 l/ha. Minimaalne pritsimiskordade vaheline intervall 10 päeva. Aprill–juuni. Pritsimine 14 päeva pärast istutamist, kuid enne õitsemist. Maksimaalne kogus hooaja jooksul on 3 l/ha.

Maasikas, teisel ja enamal kasvuaastal

Pritsimiskordade arv 1. Kulunorm pritsimiskorra kohta 1,75 l/ha. Veekogus 200–300 l/ha. Pritsimise aeg: aprill–oktoober. Pritsimine kas enne õitsemist või pärast saagi koristust.

Pritsimiskordade arv 1–3. Kulunorm pritsimiskorra kohta 0,5–1,0 l/ha. Veekogus 200–300 l/ha. Minimaalne pritsimiskordade vaheline intervall 10 päeva. Aprill–juuni. Pritsimine 14 päeva pärast istutamist, kuid enne õitsemist. Maksimaalne kogus hooaja jooksul on 3 l/ha. Pritsimise aeg: aprill–oktoober. Pritsimine kas enne õitsemist või pärast saagi koristust.

Peiulill

Pritsimiskordade arv 1–3. Kulunorm pritsimiskorra kohta 0,5–2,0 l/ha. Veekogus 300–500 l/ha. Tärkamisjärg selt: kolmest pärislehest kuni vars on saavutanud täispikkuse. Kõrgeimat doosi kasutada kui umbrohtudel on arenenud rohkem kui 2–4 lehte. Maksimaalne kogus hooaja jooksul on 3 l/ha.

Spinat seemneks

Pritsimiskordade arv 1. Kulunorm pritsimiskorra kohta 1,0 l/ha. Veekogus 100–400 l/ha. Tärkamiseelselt külvist kuni idulehtede tungimiseni mullapinnale.

Paagisegud

Lisateabe saamiseks võtke palun ühendust tootja, edasimüüja või nõustajaga.

Dokumendid

[Registri andmed](#)

[Ohutuskaart](#)

activeIngredient:

metamitroon 700 g/l

Pakend:

5 l, suspensioonikontsentraat

costRate:

pritsimiskorra kohta 0,5–2,0 l/ha; maksimaalselt hooajal 3 l/ha.

waterAmount:

100–500 l/ha

Taimekaitsetunnistus nõutav:

Ei

Tootja

Adama Ltd.

