

Hypoaspis miles

Hypoaspis miles on röövlest, keda kasutatakse peamiselt leinasääsklaste vastsete tõrjeks, kuid ta toitub ka hooghännalistest ja maapinnas asuvatest ripslaste nukkudest ning mingil määral ka sookärblaste vastsetest.

Tutvustus

Hypoaspis'e (foto autor: Jarmo Holopainen) munast täiskasvanuks kestab umbes 20 päeva (20°C). Emaste isendite munade arv sõltub temperatuurist ja saagist. Näiteks leinasääsklaste vastsetest toituv *Hypoaspis miles* muneb 50 muna (20°C). *H. miles* on üsna pika elueaga. Piisava toidu olemasolul jäävad nad kasvusubstraati umbes 2 – 3 kuuks.

Toime

Nii *Hypoaspis miles*'e noored arengujärgud kui ka täiskasvanud isendid on röövtoidulised. Nad augustavad oma saagi ja imevad tema kehavedelikku. Üks lest suudab süüa 8 väikest leinasääsklaste vastset päevas.

Leinasääsklaste kohta loe lähemalt [siit](#).

Kasutamine

Tänu kiirele elutsüklile, pikaelisusele ja mitmekesisele toitumisele sobivad *Hypoaspis*'e lestad hästi ennetavaks tõrjeks.

Puista röövlestad väikeste hunnikutena kasvusubstraadi peale pottidesse, mis asetsevad tihedalt koos. Nii leiavad emased ja isased isendid üksteist ning paarituvad, alles siis levivad teistesse pottidesse. Potte tuleb hoida koos umbes 10 päeva, et lestadel oleks aega levida ühest potist teise. Tavaliselt piisab ühest korrast.

Ripslaste tõrje

Ripslaste tõrjumiseks levita *Hypoaspis miles*'st kasvusubstraadile ennetavalt külvikorra alguses, kasutades normi 1 teelusikatäis (umbes 2 ml või ligikaudu 50 lesta) lesti taimede juurtele.

Kurgil saab lesti levitada nii, et ühe kivivillakoti peale puistatakse lestade kuhi. Siit kuhjast levivad lestad ülejäänud kottidesse.

Leinasääsklaste tõrje

Hypoaspis miles'st saab leinasääsklaste tõrjeks kasutada üheaegselt koos nematoodidega.

Aphidius ervisobib kasutamiseks:

erinevatel köögiviljakultuuridel, nagu tomat, paprika, piprad, kurk, uba
dekoratiivtaimedel, nagu roos, gerbera, krüsanteem
kasvuhoonekultuuridel japuukoolides.

Hypoaspis miles/m2		Kordus
Ennetav tõrje	100 tk/m2	1 – 2 korda iga 3 – 4 nädala tagant
Kahjureid vähe	250 tk/m2	Tavaliselt piisab ühest korrast
Kahjureid palju	500 tk/m2	Tavaliselt piisab ühest korrast

Transportimine ja säilitamine

NB! Kasureid tuleb transportida jahedas, vältides nende ülekuumenemist. Kui kodutee on pikem, tuleks kasutada termoskotti koos külmaelemendiga. Veenduge, et kasureid sisaldav pudel ei puutuks otseselt külmaelemendiga kokku. Külmaelemendi ja pudeli vahele võib panna näiteks mingi riideeseme või ajalehe.

Säilitamine: *Hypoaspis miles*´st ei saa säilitada külmkapis. Säilitada temperatuuril üle 12 .

Tooted

5000 *H. Miles* rööblesta/ 0,5 L pakendis segatuna turba ja vermikuliidiga
10 000 *H.Miles* rööblesta/ 1L pakendis segatuna turba ja vermikuliidiga
25 000 *H.Miles* rööblesta/ 1L pakendis segatuna turba ja vermikuliidiga
125 000 *H.Miles* rööblesta/ 5 L pakendis segatuna turba ja vermikuliidiga

Kahjurid:

leinasääsklaste vastsed, hooghännalised, ripslaste nukud, sookärblaste vastsed

Kasutus:

puista rööblestad väikeste hunnikutena kasvusubstraadi peale. Tavaliselt piisab ühest korrast.

costRate:

ripslaste tõrjeks kasuta 1 teelusikatäis lesti taimede juurtele, leinasääsklaste tõrjeks 100–500 tk/m2.

Taimekaitsetunnistus nõutav:

Ei

Tootja

Biotus Oy



