

# Lentagran WP

Lentagran WP on lehtede kaudu mõjuv kontaktne valiva toimega herbitsiid üheaastaste kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks sibula, talisibula, porrulaugu, šalottsibula, küüslaugu, brokoli (ehk spargelkapsa), peakapsa, lillkapsa, brüsseli kapsa (ehk rooskapsa), spargli, lehtkapsa, kähara peakapsa (ehk savoia kapsa), nuikapsa, söödakapsa, herne (rohelisena koristatav), herne (täisküpsena koristatav), porgandi, läätsse, kikerherne ja lupiini põldudel.

## Toime

Lentagran WP toime on tõhusam siis, kui umbrohi on veel väike ja heas kasvujõus. Parem umbrohutõrje tulemus saadakse siis, kui pritsitakse kuivi taimi ja õhutemperatuur on üle 10°C. Umbrohi hakkab närbuma umbes 5 – 10 ööpäeva möödumisel pritsimisest.

**Hea mõju:** hanemalts, iminõges ja virn.

**Rahuldav mõju:** kesalill, põldharakalatv, põldkannike ja vesihein.

**Nõrk mõju või mõju puudub:** nurmikad.

Lentagran tõrjub ka mõningaid lühiealisi kõrrelisi umbrohtusid.

## Kasutamine

NB! Kuna Lentagran® WP on laiendatud kasutamiseks porgandil, läätsel, kikerhernel ja lupiinil professionaalse kasutaja taotluse alusel, vastutab toote tõhususe või fütotoksilisuse eest selle kasutaja.

Kõige sobivam aeg pritsimiseks on hommikul. Toode on vihmakindel juba 1–2 tundi pärast pritsimist.

| Kultuur                                                                   | Ühekordsel pritsimisel kulunorm, kg/ha | Jaotatud pritsimisel minimaalne ühekordne kulunorm kg/ha | Maksimaalne kogus kultuurile kasvuperioodi kohta, kg/ha | Pritsimiskordade arv | Pritsimise aeg                                                                                | Ooteaeg, p |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Peakapsas, Brüsseli kapsas (ehk rooskapsas), lehtkapsas, kähara peakapsas | 2,0                                    | 0,5                                                      | 2,0                                                     | Jaotatud pritsimisel | Kasutada 2–4 nädalat pärast istutamist või kultuuri 4 lehe faasist kuni 6 lehe faasini. Kasv- | 42         |

| (ehk savoia kapsas)                                                                       |     |     |     | kuni 2<br>pritsimist.                            | ufaasis<br>14–16.                                                                                                                              |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Brokoli (ehk spargelkapsas),<br>lillkapsas                                                | 1,0 | 0,5 | 2,0 | Jaotatud<br>pritsimisel<br>kuni 2<br>pritsimist. | Kasutada<br>2–4 nädalat<br>pärast<br>istutamist<br>või kultuuri<br>4 lehe<br>faasist kuni<br>6 lehe<br>faasini. Kasv-<br>ufaasis<br>14–16.     | 42 |
| Söödakapsas                                                                               | 2,0 | 0,5 | 2,0 | Jaotatud<br>pritsimisel<br>kuni 2<br>pritsimist. | Kasutada<br>2–4 nädalat<br>pärast<br>istutamist<br>või kultuuri<br>4 lehe<br>faasist kuni<br>6 lehe<br>faasini. Kasv-<br>ufaasis<br>14–16.     | 42 |
| Sibul<br>(seemnest<br>või<br>tippsibulast),<br>šalottsibul<br>(seemnest,<br>tippsibulast) | 1,0 | 0,5 | 2,0 | Jaotatud<br>pritsimisel<br>kuni 3<br>pritsimist. | Pritsimist<br>alustada, kui<br>kultuuril on<br>1. leht<br>selgelt<br>nähtav kuni<br>kultuuri 4.<br>lehe<br>faasini. Kasv-<br>ufaasis<br>11–14. | 56 |
| Talisibul                                                                                 | 1,0 | 0,5 | 2,0 | Jaotatud<br>pritsimisel                          | Pärast<br>tärkamist,<br>kui kultuuril<br>on kolmas<br>leht selgelt                                                                             | 28 |

|                             |        |     |     | kuni 2<br>pritsimist                             | nähtav (>3<br>cm).                                                                           |    |
|-----------------------------|--------|-----|-----|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Porru                       | 2,0    | 0,5 | 2,0 | Jaotatud<br>pritsimisel<br>kuni 2<br>pritsimast. | Pärast istu-<br>tamist, kui<br>kultuuril on<br>kolmas leht<br>selgelt näh-<br>tav (>3 cm).   | 28 |
| Küüslauk                    | 2,0    | 0,5 | 2,0 | Jaotatud<br>pritsimisel<br>kuni 2<br>pritsimist. | Pärast maha-<br>panekut, kui<br>kultuuril on<br>kolmas leht<br>selgelt<br>nähtav (>3<br>cm). | 56 |
| Nuikapsas                   | 2,0    | 0,5 | 2,0 | Jaotatud<br>pritsimisel<br>kuni 2<br>pritsimist. | Kasutada<br>2–4 nädalat<br>pärast<br>istutamist<br>või<br>kasvufaasis<br>14–16.              | 42 |
| Spargel                     | 2,0    | –   | 2,0 | 1 pitsimine.                                     | 1) Enne<br>tärkamist<br>2) Vastavalt<br>lehemassile<br>pärast<br>saagikoris-<br>tust.        | –  |
| Äsja istu-<br>tatud spargel | 1,0    | 0,5 | 2,0 | Jaotatud<br>pritsimisel<br>kuni 2<br>pritsimist. | Kasutada<br>alates<br>kasvufaasist<br>21.                                                    | –  |
| Hernes (ro-<br>helisena/    | 0,75–1 | 0,5 | 1,0 | 1 või jao-<br>tatud prit-                        | 1<br>kasutuskord<br>(BBCH 13–<br>16)<br>kulunormiga                                          | –  |

|                            |     |     |     |                                                      |                                                                                                                                                                                 |   |
|----------------------------|-----|-----|-----|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| täisküpsena<br>koristatav) |     |     |     | simine kuni 2<br>korda.                              | 0,75–1<br>kg/ha . 2<br>kasutuskor-<br>da<br>kulunormiga<br>2×0,5 kg/ha<br>(BBCH<br>11–16 7–10<br>päevase<br>intervalliga).                                                      |   |
| Porgand                    | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1 või jao-<br>tatud prit-<br>simine kuni 2<br>korda. | Pritside<br>alates<br>kahest<br>pärislehest<br>kuni kuue<br>pärislehe<br>faasini<br>(BBCH<br>12–16).<br>Jaotatud<br>pritsimisel<br>intervall 7<br>päeva                         | – |
| Läätsed                    | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1 või jao-<br>tatud prit-<br>simine kuni 2<br>korda. | Ühekordne<br>pritsimine<br>(BBCH<br>13–16)<br>kulunormiga<br>1 kg/ha.<br>Jaotatud<br>pritsimisel<br>kulunormiga<br>2×0,5 kg/ha<br>(BBCH<br>13–16, 7<br>päevase<br>intervalliga) | – |
| Kikerhernes                | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1 või jao-<br>tatud prit-                            | Ühekordne<br>pritsimine<br>(BBCH<br>13–16)<br>kulunormiga                                                                                                                       | – |

|        |     |     |     |                                                   |                                                                                                                                                 |   |
|--------|-----|-----|-----|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|        |     |     |     | simine kuni 2 korda.                              | 1 kg/ha.<br>Jaotatud pritsimisel kulunormiga 2×0,5 kg/ha.<br>Esimene pritsimine BBCH 11-14, teine pritsimine 7 päevase intervalliga, BBCH 15-16 |   |
| Lupiin | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1 või jao-<br>tatud prit-<br>simine kuni 2 korda. | Ühekordne pritsimine (BBCH 13-16) kulunormiga 1 kg/ha.<br>Jaotatud pritsimisel kulunormiga 2×0,5 kg/ha (BBCH 13-16, 7 päevase intervalliga)     | – |

## Dokumendid

[Registri andmed](#)

[Ohutuskaart](#)

activeIngredient:  
püridaat 450 g/kg

Pakend:  
1 kg, märguv pulber

costRate:  
ühekordsel pritsimisel 0.75–2.0 kg/ha sõltuvalt kultuurist



waterAmount:

200–600 l/ha, sõltuvalt taimede ja umbrohu suurusest

Taimekaitsetunnistus nõutav:

Ei

Tootja

Certis Belchim B.V.