

Lontrel 72 SG

Lontrel 72 SG on selektiivne tärkamisjärgselt kasutatav herbitsiid laialeheliste umbrohtude tõrjeks teraviljadel, rapsil, maisil, rohumaadel, kõrrelistel heintaimedel (seemneks), peetidel, maasikal ja puukoolides.

Toime

Lontrel 72 SG on mõeldud laialeheliste umbrohtude tõrjeks paljudel kultuuridel. Ta hävitab paljusid umbrohuliike, näiteks kesalille, konnatatart, rukkilille ja põldohakat. Toimeaineks on klopüraliid, mis liigub taimes süsteemselt, imendudes taimedesse peamiselt lehtede kaudu ning pidurdades taimede kasvu ja ainevahetust. Selle tulemusel tundlikud umbrohud surevad. Tundlikel taimedel on mõju märgata juba 1 – 3 päeva pärast pritsimist. Kasv peatub ning umbrohi hävineb 3 – 4 nädala jooksul.

Kasutamine

Lontreli kasutatakse tärkamisjärgselt väga mitmetel kultuuridel. Järgnevalt on toodud kulunormid põllukultuuride jaoks, aiakultuuride kulunorme [vaata siin](#).

Kultuur	Kulunorm, g/ha	Kasvufaas	Kasvufaas, p
Suviraps	125 – 165	alates 2. lehest kuni esimeste õiepungadeni	12 – 55
Taliraps	125 – 165	varsumisest kuni esimeste õiepungadeni	31 – 55
Suviteravili	125 – 165	võrsumisest lipulehe ilmumiseni	21 – 37
Taliteravili	125 – 165	võrsumisest lipulehe ilmumiseni	21 – 37
Mais	165	alates 3. lehest kuni 6. pärisleheni	13 – 16
Heinaseemne põllud, karjamaad	125 – 165	võrsumisest lipulehe ilmumiseni	21 – 37

Dokumendid

[Registri andmed](#)

[Ohutuskaart](#)

activeIngredient:



klopüraliid 720 g/kg

Pakend:

1 kg, vees lahustuvad graanulid

costRate:

125 – 165 g/ha sõltuvalt kultuurist

waterAmount:

100–300 l/ha, sõltuvalt kultuuri biomassist

Taimekaitsetunnistus nõutav:

Ei

Tootja

Dow AgroSciences

