

MOXA

MOXA't kasutatakse kasvuregulaatorina kultuuri lamandumise ohu vähendamiseks nisul, odral, kaeral, rukkil, tritikalel ja seemneks kasvatatavatel kõrrelistel heintaimedel.

Toime

MOXA toimeaine etüültrineksapak imendub peamiselt taime roheliste osade (lehed ja võrsed) kaudu ning kandub algkoesse, kus pidurdab kõrresõlme kasvu. Etüültrineksapak takistab giberelliinhappe moodustumist ning see mõjutab taimerakkude kasvu, mille tulemuseks on lühem ja tugevam kõrs. Lühema ja tugevama varre tõttu väheneb lamandumise oht ning on väiksem saagikadu.

Kasutamine

Taimekaitsevahendit MOXA võib kasutada kõikidel nisu (kaasa arvatud durumnisu), odra, kaera, tritikale, rukki ja kõrreliste heintaimede (seemneks) sortidel.

MOXAt võib hooajal kasutada 1–2 korda pritsimise miinimumintervalliga 7 päeva. Vihmakindlus saabub 2 tundi pärast pritsimist. Parim mõju saavutatakse kui pritsitakse kuivi taimi ajal, kui valguse intensiivsus on kõrge (selge või kergelt pilves ilmaga). Optimaalne temperatuur on 10° C, kuid võib pritsida ka 8° C juures.

Mitte pritsida kultuure, mis on stressis liigniiskuse, kahjurite rünnaku, haiguste või külma tõttu ega siis, kui õhusooja on üle 24 °C.

Seda toodet ei tohi kasutada heinamaadel, millel karjatatakse loomi või millel tehakse heina loomasöödaks.

Kulunorm sõltub kultuurist.

Kultuur	Kulunorm 1 pritsimine	Kulunorm 2 pritsimist	Pritsimise aeg	Kasvufaas
Talinisu ja suvinisu	0,2 – 0,4 l/ha	2 x 0.15 l/ha	Puhmiku kujunemisest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni	25–39
Talioder ja suvioder	0,4 – 0,6 l/ha	2 x 0.3 l/ha	Puhmiku kujunemisest kuni lipule-	25–39

			he keelekese ilmu- miseni	
Rukis	0,5 – 0,6 l/ha	2 x 0.25 l/ha	Puhmiku kujune- misest kuni lipule- he keelekese ilmu- miseni	25–39
Talitritikale ja suvit- ritikale	0,4 – 0,6 l/ha	2 x 0.25 l/ha	Puhmiku kujune- misest kuni lipule- he keelekese ilmu- miseni	25–39
Kaer	0,3 l/ha	2 x 0.15 l/ha	Puhmiku ku- junemisest kuni teise kõrresõlme tekkimiseni	25–32
Seemneks kas- vatatavad kõr- relised heintaimed (mitmeaastane rai- hein, timut, punane aruhein, harilik aruhein)	0,4 – 0,8 l/ha	2 x 0.4 l/ha	Esimese kõr- resõlme moodustu- misest kuni näh- tavale on ilmunud ohete tipud	31–49

Paagisegud

Paagisegude tegemiseks teiste taimekaitsevahenditega küsida informatsiooni müüja, maaletooja või tootjafirma esindaja käest.

Dokumendid

[Registri andmed](#)

[Ohutuskaart](#)

activeIngredient:

etüültrineksapak 250 g/l (26.6%)

Pakend:

5 l, emulsioonikontsentraat

costRate:

Kulunorm sõltub kultuurist, nt. talinisu 0,2 – 0,4 l/ha



waterAmount:

minimaalselt 100 l/ha

Taimekaitsetunnistus nõutav:

Ei

Tootja

Globachem