

Mycostop

Biofungitsiid Mycostop® on kasutatav köögivilja, maitse- ja ilutaimede seemnete puhtimiseks, dekoratiivtaimede fusarioosse närbumistõve tõrjeks ning kurgi juurehaiguste ja tõusmepõletiku tõrjeks kasvuhoones. Preparaadil on kasvu hoogustav omadus.

Toime

Toimeaineks on kiirikseene *Streptomyces K61* niidistik ja eosed 5*10⁸ KMÜ*/g (330–430 g/kg). Tänu kiirikseene kasvu soodustavale toimele annab Mycostop 5–10% saagilisa ka tervetes istandustes.

*KMÜ – kolooniaid moodustav üksus

Kasutamine

Mycostop'i kasutatakse ennetavalt eelkõige kasvusubstraadi pritsimiseks või kastmiseks. Kasutades piiratud substraati, näiteks mineraalvatti või turbakotte, töödeldakse katmata pind taimede ümber. Peenras kasvatades töödeldakse kogu pind. Mycostop'i võib mulda viia ka tilkkastmisega.

Lahuse valmistamisel segatakse preparaat kõigepealt 0,5–1 l veega. Vee-pulbrisegul lastakse umbes tund aega seista, seejärel see segatakse korralikult ja lahjendatakse vajaliku kontsentratsioonini. Segu tuleb ära kasutada samal päeval.

Näiteid vesilahuse valmistamise kohta

Lõike- ja potililled

Taimede kasvusubstraat kastetakse kohe pärast istutamist või potistamist Mycostop'i vesilahusega. Piiratud substraadil kasvatatavate lõike- ja potililledede puhul on kulunorm 2–5 g/1000 taime kohta (ehk 0,01% segu 20–50 ml/taime kohta). Peenras kasvatades on kulunorm 0,01–0,1 g/m² kohta (ehk 0,01% segu 0,1–1 l/m² kohta). Tehissubstraati töödeldakse igal kuul ja turvast igal teisel kuul.

Noortaimede juured võib enne istutamist kasta 0,01% aine vesilahusesse.

Kasvuhoonekurk

Kasvusubstraati pritsitakse või kastetakse vesilahusega kohe pärast taimede istutamist. Preparaadi kulunorm turbal on 0,01–0,1 g/m² (ehk 0,01% lahust 0,1–1 l/m² kohta) ja piiratud substraadil 5–8 g/1000 taime kohta (ehk 0,05% vesilahust 10–16 ml taime kohta). Tehissubstraati töödeldakse kasvuperioodil igal kuul ja turvast igal teisel kuul.

Aedviljade, maitse- ja ilutaimede seemnete puhtimine

Kuivseemneid puhitakse vahetult enne külvi. Mycostop'i pulber segatakse ühtlaselt seemnetega, järgides kultuuride kulunormi soovitusi.

Puhitud seemned tuleb külvata hiljemalt nädala jooksul pärast puhtimist.

Lahuse kontsentratsioon	Kulunorm	Vee kogus
0,01%	1 g pulbrit	10 l vett
0,05%	1 g pulbrit	2 l vett

Kultuurid	Kulunorm 1 kg seemne kohta
Kapsad, sibul, porrulauk, maitsetaimed	8 g pulbrit
Juurvili, lehtaedvili, tomat, kurk, liblikõielised	5 g pulbrit
Salat	2 g pulbrit

Paagisegud

Toode on kasutatav koos enamiku keemiliste pestitsiididega ning samuti integreeritud kahjuritõrjes. Toodet ei tohi segada segamisaagis koos pestitsiidide või kontsentreeritud väetistega.

Dokumendid

[Registri andmed](#)

[Ohutuskaart](#)

activeIngredient:

Streptomyces K61 niidistik ja eosed $5 \cdot 10^8$ KMÜ/g
(330–430 g/kg)

Pakend:

5 g, 25 g, 50 g, 100 g, märguv pulber

waterAmount:

0,5–1 l veega segamine, lahjendamine vastavalt vajadusele

costRate:

0,01% segu 0,1–1 l/m² kohta; 5–8 g/1000 taime kohta

Taimekaitsetunnistus nõutav:

Ei



Tootja

DANSTAR FERMENT A.G