

Pixxaro EC

Süsteemne lehtede kaudu mõjuv herbitsiid kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks nisul, odral, rukkil ja tritikalel.

Toime

Pixxaro EC sisaldab metüülhalauksifeeni (Arylex™ Active) ja fluroksüpüüri, mis mõlemad kuuluvad sünteetiliste auksiinide herbitsiidide hulka. Nähtavad tulemused ilmnevad tavaliselt mõni päev pärast pritsimist, lõplikku tulemust saab oodata 4 nädalat peale pritsimist.

Pixxaro EC tõrjub paljusid üheaastaseid laialehelisi umbrohtusid, nagu roomav madar ehk virn, vesihein, kukemagun, valge hanemalts, harilik punand, kurereha liigid ja kare kõrvik.



Kasutamine

Pixxaro EC sobib **ainult kevadel kasutamiseks**.

Pixxaro EC'ga võib töödelda kõrrelistega segunenud põllukultuure. Ära kasuta liblikõielistega (nt ristikuga) segunenud põllukultuuridel ega stressis kultuuridel. Herbitsiidi võib kasutada temperatuuridel 5–25 °C. Ulatusliku põua korral võib toime olla nõrgem. Mõnikord võib preparaadiga pritsimine põhjustada kultuuri kolletumist, mis möödub 2–3 nädalaga ning ei mõjuta teravilja saagikust ega kvaliteeti.

Soovitav pritsimiskogus on 100–400 liitrit vett hektari kohta. Madalaimat vee kogust kasutada, kui taimik on hõre ja umbrohud väikesed. Tiheda taimikuga põllul on vajalik vee kogus 200–400 l/ha. Pixxaro saavutab vihmakindluse tunni aja jooksul pärast pritsimist.

Talinisu, talioder, rukis, tritikale

Suvinisu, suvioder

Spektri laiendamiseks on võimalik Pixxarot segada:

1. [Trimmer 50 SG-ga](#)

- suurendab mõju kesalille, rapsi varise, sinepi, põldkannikese ja mailaste osas;
- suurendab keerulistes oludes efektiivust maltsale ja rukkilillele.

2. [MCPA-ga](#)

- parem mõju ka ohakale;
- CL rapsi varise tõrjeks.

Toote toime tugevdamiseks hariliku kesalille vastu on soovitatav segada Pixxaro kokku 0,075 l/ha [Primus](#)'ega.

Märgaja kasutamine ei ole Pixxaro EC puhul vajalik.

BBCH	Kasvufaas	Kulunorm, l/ha
23-29	3. võrsest kuni võrsumise lõpuni	0,25
30-39	kõrsumise algusest kuni lõpuni	0,4
40-45	viljatupe avanemisest kuni avanemise keskpaigani	0,5

BBCH	Kasvufaas	Kulunorm, l/ha
13-19	3. pärislehe faasist kuni võrsumise alguseni	0,125
20-29	võrsumise algusest kuni võrsumise lõpuni	0,25
30-45	kõrsumise algusest kuni viljatupe avanemise keskpaigani	0,35

Dokumendid

[Info Registris](#)

Laadi alla:

[Etikett](#)

[Ohutuskaart](#)

[Infoleht](#)



activeIngredient:

metüülhalauksifeen 12,5 g/l; fluroksüüpüür 280 g/l

Pakend:

5 l, emulsioonikontsentraat

costRate:

0,125–0,5 l/ha sõltuvalt kasvufaasist

waterAmount:

100–400 l/ha

Taimekaitsetunnistus nõutav:

Ei

Tootja

Corteva, Inc. (Corteva Agriscience)



CORTEVA[™]
agriscience