

Prestop Mix

Biofungitsiidid märgmädaniku ja juurehaiguste tõrjeks köögiviljadel ning maasika ja vaarika hahkhallituse tõrjeks mesilaste või kimalaste kaudu.

Clonostachys rosea tüvi J1446 seeneniidistik ja eosed

Toime

Biofungitsiidid märgmädaniku ja juurehaiguste tõrjeks köögiviljadel ning maasika ja vaarika hahkhallituse tõrjeks mesilaste või kimalaste kaudu.

Prestop Mix'i toimeaineks on seene *Clonostachys rosea* tüvi J1446 elusad eosed ja niidistik, 107 –109 KMÜ*/g.

**KMÜ – kolooniaid moodustav üksus*

Preparaati kasutatakse:

- märgmädanikku ja juurehaigusi tekitavate patogeensete seente (nagu *Pythium* ja *Rhizoctonia*) tõrjeks neil köögiviljadel, maitse- ja ilutaimedel, mis kasvavad turba- või muul orgaanilisel kasvupinnasel kasvuhoones, tunnelviljeluses ja avamaal;
- meemesilaste kaudu leviva *Botrytis*-nakkuse tõrjeks maasikal ja vaarikal avamaal, kasvuhoones ja tunnelviljeluses.

Kasutamine

Prestop Mix'i võib kasutada ka mahepõllumajanduslikus tootmises kooskõlas määrusega (EÜ) nr 834/2007.

Juurehaiguste profülaktika eesmärgil kasutatakse vahendit veega segatult. Vahendit saab kasutada ka integreeritud haigustõrjeks: sõltuvalt valmistamis- ja kasutamismeetodist pidage vahendiga Prestop Mix ja muu (sealhulgas mikrobioloogilise) pestitsiidiga töötlemise vahel kuni 7 päeva vahet.

Maasika ja vaarika hahkhallituse tõrjeks levitatakse Prestop Mix'i õitsemisperioodil mesilaste või kimalaste kaudu kuiva pulbri kujul. Kasutuskordade arv on 1–12 korda hooaja jooksul.

Tähelepanu! Fungitsiidid ei sobi pritsimiseks ega vihmutusüsteemi kaudu levitamiseks. Mitte kasutada juurdumata pistikutel. Kivivilja kasutamine kasvupinnasena ei ole soovitatav.

Köögiviljade seenhaiguste tõrje

Seenhaiguste tõrjet tehakse ennetavalt kasvusubstraadi töötlemisega külvi, ümberistutamise või istutamise ajal. Sega Prestop Mix'i lahust kasvusubstraadi sisse või leota lahusega kasvusubstraati.

Näiteid vesisuspensiooni valmistamise kohta

Soovituslikud kasutusnormid

Kasvusubstraadile lisamisel kasutage 2% vesisuspensiooni. Kasutage 10–25 liitrit suspensiooni 1 m³ kuiva kasvusubstraadi kohta (vajalik pulbri kogus 200–500 g/m³).

Väikeste seemikute leotamiseks kasutage 0,5% suspensiooni 1–2 liitrise suspensioonidoosina 1 m² kohta (pulbri kogus 5–10 g/m²).

Üksikute juurepallide ja potitaimede töötlemisel leotage kasvusubstraati näiteks 0,5% suspensiooniga, kasutades juurepalli või poti suurusele vastavat doosi.

Maasika ja vaarika hahkhallituse tõrje

Hahkhallituse tõrje teostatakse Prestop Mix pulbri levitamisega mesilaste või kimalaste kaudu. Paiguta maasika- või vaarikapõllu kõrvale õitsemise algusajaks kaks eraldiseisva dosaatoriga mesilastaru või kimalaste „Lendavate doktorite“ taru hektari kohta. Kogu õitsemisperioodi vältel lisa igal hommikul dosaatoritesse 5–10 g Prestop Mix'i pulbrit. Pulbri kogukulu on 300–500 g/ha.

Tähelepanu! Prestopi kasutamisel tuleb vältida pulbri levitamist taru sisemusse. Selleks jälgige, et mesilased ja kimalased väljuvad tarust läbi dosaatori, kuid sisenevad eraldi sissepääsust.

Lahuse kontsentratsioon	Prestop Mix	Vesi
0,5%	100 g	20 liitrit
2%	100 g	5 liitrit

Poti/ juurepalli maht	Lahust 1000 taime kohta	Pulbrit 1000 taime kohta
100 ml	4–10 l	20–50 g
250 ml	10–25 l	50–125 g
500 ml	20–50 l	100–250 g
1 liiter	40–100 l	200–500 g

Paagisegud

Ära sega toodet ühegi teise pestitsiidi või väetisekontsentraadiga.

Dokumendid

[Registri andmed](#)

[Ohutuskaart](#)

activeIngredient:

Clonostachys rosea tüvi J1446 seeneniidistik ja eosed,
107 –109 KMÜ/g

Pakend:

400 g, 1 kg

costRate:

300–500 g/ha

Taimekaitsetunnistus nõutav:

Ei

Tootja

Verdera