

Previcur Energy

Previcur Energy on süsteemne fungitsiid kurgi, suvikõrvitsa, baklažaani, meloni, arbuusi jt kõrvitsaliste, tomati, paprika, salati, redise, pea-, leht- ja lillkapsa, kähara endiivia, põldkännaku e. lambasalatil ning dekoratiivtaimede haiguste tõrjeks kasvuhoones; samuti seenhaiguste tõrjeks avamaal kasvaval salatil, äädikakurgil (kornišon), redisel ja dekoratiivtaimedel.

Toime

Previcur Energy kaitseb kurki, suvikõrvitsat, baklažaani, melonit, arbuusi, tomatit, paprikat, salatit, redist, pea-, leht- ja lillkapsast ning dekoratiivtaimi nende kasvu algfaasis kahjustavate haiguste eest (Phytophthora, Pythium, Aphanomyces, Peronospora, jt). Previcur Energy sisaldab kahte, teineteist täiendavat toimeainet. Propamokarb peatab seene rakumembraani moodustumise; pidurdab seene mütseeli kasvu, samuti seeneeoste moodustumist ja idanemist. Fosetüül stimuleerib taimede loomulikku kaitsesüsteemi. Fosetüül aitab ka nakkust ennetada, peatades spooride idanemise ja taimesse tungimise, lisaks omab ka ravivaid omadusi – pidurdab eoste vabanemist eoskotist ning peatab mütseeli arengu.

Kasutamine

Laiendatud kasutusala väikese kasvupinnaga kultuurile: harilik kuusk, harilik mänd ja arukask katmikala külvides seenhaiguste (tõusmepõletik, võrselaiksus) tõrjeks. NB! Kuna Previcur Energy on laiendatud kasutamiseks harilikule kuusele, harilikule männile ja arukasele vastutab toote tõhususe või fütotoksilisuse eest selle kasutaja.

Previcur Energy kasutamismõõtmised:

- 1) Kastmisel ja substraadi töötlemisel kasvuhoones** – pea-, lill- ja lehtkapsas, kähara endiivia, põldkännak e. lambasalat.
- 2) Substraadi kastmine + tilkkastmine kasvuhoones** – tomat, baklažaan, kurk, suvikõrvits, paprika, melon, arbuus.
- 3) Substraadi kastmine kasvuhoones + pritsimine lehe kaudu kasvuhoones ja avamaal** – salat, lühiviljaline avamaakurk (kornišon), redis, dekoratiivtaimed.

Substraadi kastmine

Kastetakse 1–2 korda, kulunorm on sõltuvalt kultuurist 3–6 ml/m², töölahus 0,15% – 0,3%, intervall 7–10 päeva. Lahuse kulu 2 l/m² (20000 l/ha).

Tilkkastmine

Sõltuvalt kultuurist ja substraadist 1–4 tilkkastmiskorda alates teisest lehepaarist kulunormiga 0,1–0,3 ml/m². Töölahuse kulu: 1000–3000 l/ha.

Pritsimine

Pritsitakse 1–2 korda kulunormiga 2,5 l/ha. Töölahuse kulu 400–1000 l/ha.

Ooteaeg on sõltuvalt kultuurist 3 – 14 päeva. Pea-, lill ja lehtkapsal, kähar endiivial, põldkännakul e lambasalatil ja dekoratiivtaimedel ooteaeg puudub.

Laiendatud kasutusala väikese kasvupinnaga kultuurile: harilik kuusk, harilik mänd ja arukask katmikala külvides seenhaiguste (tõusmepõletik, võrselaiksus) tõrjeks. Kulunorm on 6,0 l/ha ning lubatud on teha 3 pritsimist. Pritsimine okaspuudkülvidel 2–4 nädalat pärast külvamist ja kasekülvidel pärast tärkamist 30 päevase vahega.

Dokumendid

[Registri andmed](#)

[Ohutuskaart](#)

activeIngredient:

propamokarb 530 g/l, fosetüül 310 g/l

Pakend:

1L, vesilahus

costRate:

substraadi kastmine 3–6 ml/m², tilkkastmine 0,1–0,3 ml/m², pritsimine: 2,5 l/ha

Taimekaitsetunnistus nõutav:

Ei

Tootja

Bayer AG

