

Priaxor

Priaxor on kaitsva ja raviva toimega süsteemne fungitsiid haiguste tõrjeks tali- ja suvinisul, tali- ja suviödraal, rukkil, talitritikalel ja kaeral.

Toime

Priaxor sisaldab kahte toimeainet: püraklostrobiini ja fluksapüroksaad.

Püraklostrobiin on kaitsev fungitsiid, sisaldades strobiluriini grupi raviva mõjuga toimeaineid, mis toimivad väga tõhusalt rooste haigustele, nisu-pruunlaiksusele (DTR), võrklaiksusele ja äärislaiksusele. Püraklostrobiini füsioloogiline toime suurendab mullalämmastiku omastamist ja taime stressi taluvust. Püraklostrobiiniga töödeldud lehed püsivad kauem rohelised, mistõttu taim vananeb hiljem. Nende mõjul suureneb teravilja saak ja saadakse parem tera kvaliteet.

Fluksapüroksaad on uus laia tõrjespektriga, kaitsva ja raviva mõjuga toimeaine võrklaiksuse, kõrreliste jahukaste, ramularioosi, äärislaiksuse, helelaiksuse, nisupruunlaiksuse (DTR) ja rooste haiguste tõrjeks teraviljadel.

Kahe toimeaine kombinatsioon tagab hea ja pikaajalise mõju peamistele teraviljade haigustele. Fungitsiidi efektiivsus kestab enamike haiguste puhul 30–40 päeva. Priaxor on väga hea ja pikaajalise mõjuga (40–50 päeva) rooste liikide vastu.

Efektiivsuse tagamiseks tuleb Priaxor'i kasutada alati soovitatud täisnormiga või segus erineva ristresistentsuse grupi ravitoimega fungitsiidi sobiva kulunormiga.

Kasutamine

Parim tulemus ja pikim toimeaeg saavutatakse, kui pritsida ennetavalt või haiguste varajases lööbimisfaasis. Priaxor'i kulunorm on 0,75–1,5 l/ha või jaotatult 2 x 0,75 l/ha 21-päevase intervalliga. Väiksemat kulunormi kasuta ennetava tõrjena, kui haiguste surve ei ole suur, ilmastik ei ole haiguste arenguks soodne ning kui teravilja sort on haiguskindlam. Suuremat kulunormi tuleb kasutada, kui haiguste surve on kõrge, ilmastiku tingimused on haiguste arenguks soodsad ja kui sort on haigustele vastuvõtlik.

Vee hulk on 100–300 l/ha ning ooteaeg 35 päeva. Toode on vihmakindel 1 tund pärast pritsimist.

Tali- ja suvinisu

Kulunorm 0,75–1,5 l/ha helelaiksuse, pruun rooste, kollase rooste, nisu-pruunlaiksuse (DTR), kõrreliste jahukaste tõrjeks kasvufaasis täielik võrsumine kuni õitsemise lõpp (BBCH 25–69).

Tali- ja suviödraal

Kulunorm 0,75–1,5 l/ha pruun rooste, kollase rooste, võrklaiksuse, äärislaiksuse, kõrreliste jahukaste, ramularioosi ja suviödraal päikese põletuse kahjustuse tõrjeks kasvufaasis täielik võrsumine kuni õitsemise lõpp (BBCH 25–69).

Talirukis ja -tritikale

Kulunorm 0,75–1,5 l/ha pruun rooste, kollase rooste, kõrreliste jahukaste ja äärislaiksuse tõrjeks kasvufaasis täielik võrsumine kuni õitsemise lõpp (BBCH 25–69).

Kaer

Kulunorm 0,75–1,5 l/ha kaera-pruunlaiksuse ja kõrreliste jahukaste tõrjeks kasvufaasis täielik võrsumine kuni õitsemise lõpp (BBCH 25–69).

Paagisegud

Kasutades paagisegusid, tuleb iga toode lisada pritsipaaki eraldi, järgides kõiki segude valmistamise juhiseid. Laboratoorsete katsete põhjal sobib Priaxor kokku fungitsiididega Corbel, Opus, Flexity, kasvuregulaatoritega CCC/Cycocel 750, Terpal, Medax Top. Teiste firmade toodetega segamisel konsulteerige toote maaletootja ja turustajaga.

Dokumendid

[Registri andmed](#)

[Ohutuskaart](#)

activeIngredient:

fluksapüroksoad 75 g/l, püraklostrobiin 150 g/l

Pakend:

5 l, emulsioonkontsentraat (EC)

costRate:

0,75–1,5 l/ha, vee kogus 100–300 l/ha

waterAmount:

100–300 l/ha

Taimekaitsetunnistus nõutav:

Ei

Tootja

BASF A/S

