

Ranman Top

Ranman Top on fungitsiid kartuli-lehemädaniku tõrjeks kartulil, tomatil ja baklažaanil, ebajahukastmete tõrjeks mugulsibulal, küüslaugul, šalottsibulal, kurgil, suvikõrvitsal, söödava koorega kõrvitsatel, dekoratiivtaimedel ning pruunmädaniku tõrjeks tomatil ja baklažaanil.

Toime

Ranman Top on fungitsiid, mis tõrjub väga hästi Oomycetes klassi kuuluvaid seeni, eriti *Phytophthora infestans*'i. Ta on kaitsva iseloomuga ning teda peab kasutama enne haiguse lööbimist. Esimene pritsimine tehakse ennetavalt, kui ilmastikutingimused on haiguse teket soodustavad. Ranman Top vähendab oluliselt kartuli-lehemädaniku poolt kahjustatud mugulate osakaalu koristamisel ja hilisemal hoidmisel. Ranman Top on kartuli suhtes väga selektiivne. Tema kasutamine ei põhjusta kartulil mingeid kahjustusi.

Kasutamine

Ranman Top vähendab oluliselt kartuli-lehemädaniku poolt kahjustatud mugulate osakaalu koristamisel ja hilisemal hoidmisel. Preparaat on kartuli suhtes väga selektiivne. Tema kasutamine ei põhjusta kartulil mingeid kahjustusi.

Kasutusala on laiendatud väikese kasvupinnaga kultuurile: avamaa mugulsibul, küüslauk, šalottsibul; avamaa ja kasvuhoone kurk, suvikõrvits, söödava koorega kõrvitsad, dekoratiivtaimed ja tomat; kasvuhoone baklažaan. Nende kultuuride puhul vastutab toote tõhususe või fütotoksilisuse eest selle toote kasutaja.

Kartul

Kulunorm on 0,5 l/ha. Pritsimislahuse hulk 200–400 l/ha. Maksimaalne pritsimiste arv 6. Pritsimiste intervall 5–10 päeva sõltuvalt haiguse lööbimisest. Lubatud on fungitsiidiga teha järjest kuni 3 pritsimist. Ooteaeg on 7 päeva. Vahepritsimisteks kasutada sellise toimega preparaate, mis ei mõju kui kinoonide sisemised pidurdajad.

Avamaa kurk

Kulunorm on 0,5 l/ha, maksimaalselt 3 l/ha hooaja jooksul. Vee kulunorm 200–400 l/ha. Ranman Top'iga on lubatud teha avamaa kurgile kuni 3 järjestikust pritsimist ja kokku kuni 6 pritsimist kasvuperioodi jooksul. Vahepritsimisteks kasutada sellise toimega preparaate, mis ei mõju kui kinoonide sisemised pidurdajad.

Teised kultuurid

Kulunorm

Kartul, kurk avamaal ja kasvuhoones, suvikõrvits, söödava koorega kõrvitsad ja dekoratiivtaimed kasvuhoones, baklažaan kasvuhoones ja tomat avamaal ja kasvuhoones 0,5 l/ha.

Mugulsibul, küüslauk, šalottsibul (avamaa): 0,5 – 0,625 l/ha.

Vee kogus

Mugulsibul, küüslauk, šalottsibul, kartul, kurk, suvikõrvits, söödava koorega kõrvitsad: 200–400 l/ha.
Dekoratiivtaimed: 500–2000 l/ha.

Tomat avamaal: 400–1200 l/ha.

Tomat ja baklažaan kasvuhoones: 600–1200 l/ha.

Täpsemad kasutustingimused leiad [siit](#).

Haigused	Kulunorm, l/ha	Vee kogus, l/ha	Pritsimiste arv	Pritsimise aeg	Intervall, p	Ooteaeg, p
Lehemä- danik	0,5	200 – 400	6	Esimene pritsimine ennetavalt, kui ilmas- tikutingimused on haiguse teket soodustavad.	5 – 10	7

Haigused	Kulunorm, l/ha	Vee kogus, l/ha	Pritsimiste arv	Pritsimise aeg	Intervall, p	Ooteaeg, p
Ebajahukaste	0,5 l/ha (max 3 l/ha)	200 – 400	3+3	Pritsida, kui esimene vili peavarrel on saavutanud oma tüüpilise suuruse ja kuju kuni täisküp- suseni (kõik viljad on omandanud sordiomase värvuse)	7	3

	hooaja jook- sul)			BBCH 71–89.		
--	----------------------	--	--	----------------	--	--

Dokumendid

[Registri andmed](#)

[Ohutuskaart](#)

Paagisegud

Ranman Topi võib kasutada segus alljärgnevate preparaatidega. Paagisegu valmistamisel lisage kõigepealt Ranman Top ja siis segupartner.

Dithane NT, toimeaine mankotseeb, kulunorm 2 kg/ha.

500 SC, toimeaine fluasinaam, kulunorm 0,4 l/ha.

activeIngredient:

tsüasofamiid 160 g/l

Pakend:

5 l, suspensioonkontsentraat

costRate:

0,5 – 0,625 l/ha.

waterAmount:

200–400 l/ha

Taimekaitsetunnistus nõutav:

Ei

Tootja

ISK Biosciences