

Ratimor vahaplokid Brodi 10 g

Vahaplokil on palju servi, mis meelitavad närilisi rohkem süüa närima. Kui plokki serv on katki näritud, siis puruneb plokk väikesteks tükkideks ja süüt on veel paremini süüdav. Sobivad ka niisketes tingimustes: õue, garaaži, puukuuri, kasvuhoonesse, muru- ja põllutraktorite juhtmete kaitsmiseks jm.

Ratimor vahaplokkidel on keskel auk, mis võimaldab mürgisüüa kindlalt kinnitada süüdama, vältides plokkide välja lohistamist ja suurendades ohutust ning kontrolli.

Kasutamine

Näriliste kiireks ohjamiseks tuleb kindlasti kasutada rottide ja hiirte populatsioonile vastavas koguses mürgisüüa. Kui mürgisüüa on liiga vähe, siis ei süü mõned närilised piisavalt süüa, et saada kätte surmav annus, ja neid isendeid ei õnnestu kõrvaldada. Samuti võivad ebapiisavas koguses mürgisüüa tarbinud närilised edaspidi hakata seda vältima. Seetõttu tuleks süüdapunktid 1–2 päeva pärast esimese mürgisüüa väljapanemist üle kontrollida ja mürgisüüa juurde panna, kui seda on süüdud.

- Asetage süüt kohta, kus on näriliste aktiivsuse märke, näiteks värsked väljaheid, pesade ja urgude sisse või lähedusse, jooksuradadele ja näriliste toitumiskohtadesse.
- Ratimor vahaplokid tuleb kinnitada süüdama. Süüt tuleb kindlalt hoiustada nii, et see minimeeriks teiste loomade või laste süümise ohtu. Kinnitage süüt nii, et seda ei saaks minema lohistada.
- Asetage süüdama hoonetesse ja nende ümbrusesse, keskendudes esmajoones piirkondadele, kus rotte/hiiri on nähtud. Samuti tuleks üks süüdapunkt asetada kummalegi poole iga ukseava, mille kaudu närilised võivad liikuda.
Paigutage süüdapunktid kogu alale. Üldiselt on palju tõhusam kasutada suuremat hulka väikeseid süüdapunkte võrreldes väiksema arvu suurte süüdapunktidega. Suured süüdapunktid suurendavad ohtu metsloomadele ja teistele mitte-sihtrühma loomadele.
- Kui mürgisüüa andmine peab kestma üle ühe nädala, siis jätkake mürgisüüa lisamist iga seitsme päeva tagant, kuni tarbimine lõppeb.
- Tõrjeprogrammi alguses tuleks kõrvaldada muud kättesaadavad toidud.
- Tõrjeprogrammi ajal tuleb piisava sagedusega tegeleda ka surnud näriliste otsimise ja kõrvaldamisega (vähemalt kaks korda nädalas).
- Kanalisatsioonis kasutamisel tuleks süüt asetada nii, et see oleks kaitsstud üleujutuse või paigalt nihkumise eest.
- Aseta süüt näriliste hoonetesse sisenemiskohtadesse põrandale ja masinate ümber.

NB! Ärge asetage süüa näiteks kombaini kabiini, sest see võib meelitada närilised sinna süüa. Enne hiire- ja rotimürgi kasutamist tuleb kaaluda ennetavaid tõrjemeetmeid nagu toidu eemaldamine ja sissepääsuavade sulgemine, ning kemikaalivabu tõrjemeetodeid.

Kasuta Ratimori koos lukustatava süüdama

Söödamaja sobib ideaalselt kitsastesse peibutusolukordadesse. Söödamaja sisaldab nelja vertikaalset söödaasendit lukustusvarrastega, mis ei kuku puhastamise ajal välja, ning eemaldatavat ümarate nurkadega alust maja kiireks teenindamiseks. Söödamaja hoiab sööda lastele ja koduloomadele kättesaamatus kohas. Söödamaja pakub peibutus- ja püüdmisvõimalusi vastavalt Sinu vajadustele.

1. **Paiguta söödamaja nii, et sissekäik oleks seina ääres.** Närilised liiguvad põhiliselt mööda samu radu ja need kulgevad tavaliselt seinte äärest, mis pakuvad närilistele kaitset. Söödamaja tuleks paigutada nii, et see jääks närilise teele, see aitab neil sellega harjuda ning teeb ka söödamajja mineku turvalisemaks.

2. **Söödamajad tuleks paigutada kohtadesse,** kus on näha näriliste tegevuse jälgi ja hoonesse sissepääsude juurde. Võimalusel paigutada söödamajad seinatagustesse, seal tunnevad närilised end turvalisemalt ja mürgisööda tarbimine on nende jaoks mugavam.

3. **Jälgi, et sööta oleks alati piisavalt.** Söödamajasid tuleks peale paigaldamist jälgida tihedamalt paari päeva järel ja asendada tarbitud sööt. Kui tarbimine söödapunktides väheneb, siis võib kontrolli teha harvemini (1–2x nädalas).

Kasutage Ratimori ohutult! Enne kasutamist lugege lisatud teave alati läbi!

LOOMALIIK	Olukord	Kogused iga söödapunkti jaoks
Koduhiired	Siseruumides ja õues hoonete ümbruses	20 g kuni 40 g (1–2 vahaplokki) iga 2 kuni 5 meetri järel
Ränd- ja kodurotid	Siseruumides ja õues hoonete ümbruses	100 g kuni 140 g (5–7 vahaplokki) iga 5 kuni 10 meetri järel

8 nippi näriliste efektiivseks tõrjumiseks

1. **Jälgi, kus närilised tegutsevad.** Sellest annavad märku jäljed tolmus, väljaheited, kahjustused ja lõhn.

2. **Hoia ruume puhtana ja korrastatuna.** Mida vähem on kohti, kus närilised saavad rahulikult ringi liikuda ja ennast peita, seda keerulisem on neil hoonetes sees pesitseda.

3. **Piira ligipääsu toidule.** Masinad tuleks väga hoolikalt enne talveks seisma panemist puhastada, et vältida näriliste huvi nendes pesitsemise vastu. Samuti ei tohiks jätta laiali asju, mis võiks närilistele toiduks sobida. Teravilja ladudes on see küll keeruline, aga muudes ruumides tuleks kindlasti tähelepanu pöörata.

4. **Sulge avad.** Mida vähem avasid hoonel on, seda keerulisem on närilistel hoonesse tungida. Arvestama peab sellega, et närilised suudavad läbi pugeda väga väikestest avadest (nt laius 1,3 cm). Võimalusel tuleb sulgeda kõik sellised avad, mis on tekkinud kas ajaga või tehtud näriliste poolt.

5. **Paigalda söödamajad nii sise- kui välisruumidesse,** sest närilised elutsevad tavaliselt nii sees kui väljas. Kui väljas on tingimused soodsad, ei tungi nad nii palju eluruumidesse, kuid võivad siiski pesitseda ümber hoonete.

6. **Veendu, et sööta oleks alati piisavalt.** Muidu võib tekkida olukord, kus sööt lõppeb ja näriline saab sellest ainult halva kogemuse ja ei tarbi seda sööta enam.

7. **Närilised on kartlikud uute asjade suhtes.** Söödamajade paigaldamisel võib minna aega kuni nädal, enne kui närilised julgevad nendesse siseneda. Seega ei pea muret tundma, kui sööda väljapanekul seda kohe tarbima ei hakata.

8. **Jätka monitoorimisega,** isegi kui probleem tundub olevat lahendatud, sest soodsad tingimused võivad kohale meelitada uued närilised.

Dokumendid

[Ohutuskaart](#)

Märkmed

Ratimor vahaplokid on professionaalseks kasutamiseks mõeldud taimekaitsevahend.

Toote ostul on vajalik esitada kehtiv taimekaitsetunnistus.

activeIngredient:

Brodifaakum 0.0029 %/ 0,029 g/kg, (CAS No.: 56073-10-0)

Pakend:

5 kg

costRate:

20–70 g iga 5 meetri järgi

Taimekaitsetunnistus nõutav:

Ei

Tootja

Unichem



<https://www.unichem.si/>