

Rexade 440

Rexade 440 on laia toimespektriga süsteemne herbitsiid kaheiduleheliste ning kõrreliste umbrohtude tõrjeks kevadel tali- ja suvinisul, talitritikalel, talirukkil.

Toime

Rexade 440 sisaldab halauksifeeni, mis kuulub sünteetiliste auksiinide herbitsiidide hulka ja ALS inhibiitoreid püroksulaami ja florasulaami. Visuaalsed sümptomid ilmnevad olenevalt kultuurist 3–4 nädalat peale töötlemist.

Rexade 440 tõrjub eriti efektiivselt selliseid umbrohtusid nagu rukkikastehein, tuulekaer, põldkannike, roomav madar e virn, rukkilill, kukemagun, konnatatar ja kesalill. Täpsema ülevaate herbitsiidi mõjust annavad järgnevad tabelid, kus xxxx = >90%, xxx = 85–90%, xx = 70–85%.

Üheidulehelised umbrohud	Mõju
Orashein	xxxx
Roti-rebasesaba	xx(x)
Rukkihein	xxxx
Tuulekaer	xxx
Luste	xx(x)
Raiheinad	xx(x)
Murunurmikas	xx
Harilik nurmikas	xxx
Kaera ja odra kõluterad	xx

Kaheidulehelised umbrohud	Mõju
Harilik puju	xxxx
Rapsi kõluterad	xxxx
Harilik hiirekõrv	xxxx
Rukkilill	xxx
Valge hanemalts	xxx

India krüsanteem	xxxx
Ohakas	xxx
Harilik kurekael	xxxx
Punand	xxx
Kare kõrvik	xxxx
Roomav madar	xxxx
Kurereha	xxxx
Iminõges	xxxx
Rand-kesalill	xxxx
Põld-lõosilm	xxxx
Kukemagun	xxxx
Erilehine linnurohi	xx
Põld-konnatatar	xxx
Ida-ristirohi	xx
Põldsinep	xxxx
Vesihein	xxx
Mailane	xxx
Põldkannike	xx

Kasutamine

Parima efekti saavutamiseks ei soovitata pritsimist teha hiljem kui teise kõrresõlme moodustumiseni (kasvufaas BBCH 32) ning pritsida tuleks, kui umbrohud on väikesed, 2–4 faasis, ja mitte hiljem kui 6–8 lehe faasis. Õhutemperatuur pritsimisel peaks jääma vahemikku 5–25 °C. Vältida pritsimist põuastes tingimustes, enne öökülmade saabumist ja stressis taimede puhul. Vihmakindlus tekib 1 tunni möödudes pritsimisest.

Rexade 440 on mõeldud kasutamiseks koos märgajaga [Dassoil](#) (kulunorm 0,5 l/ha). Lubatud on pritsida 1 kord. Rexadet ei tohi kasutada liblikõieliste allakülvide (nt ristik) korral.

Talinisu, talirukis ja talitritikale

Kulunorm 37,5–50 g/ha + 0,5 l/ha Dassoil. Pritsimine kolmandast kõrvalvõrsest kuni teise kõrresõlme moodustumiseni (BBCH 23–32).

Suvinisu

Kulunorm 40 g/ha + 0,5 l/ha Dassoil. Pritsimine esimesest kõrvalvõrsest kuni teise kõrresõlme moodustumiseni (BBCH 21–32).

Paagisegud

Mitte segada fenoksaprop-P-etüüli või klodinofopi sisaldavate herbitsiididega, kuna see võib vähendada toote efektiivsust. Tuleks arvestada 14 päevase ooteajaga töötlemiste vahel.

[Info Registris](#)

[Infoleht](#)

[Ohutuskaart](#)

Pakend:

0,5 kg, vees lahustuvad graanulid

Tootja

Corteva, Inc. (Corteva Agriscience)

