

Rodeo Plus

Rodeo Plus on mitteselektiivne herbitsiid, mida kasutatakse enamike ühe- ja mitmeaastaste seemne- ja juurumbrohtude tõrjeks.

Rodeo Plus on mitteselektiivne herbitsiid, mida kasutatakse enamike ühe- ja mitmeaastaste seemne- ja juurumbrohtude tõrjeks.

Toime

Preparaat mõjub roheliste lehtede ja varte kaudu ning levib sealt juurestikku. Preparaadi mõju on märgata 5–10 päeva pärast pritsimist. Umbrohud hävivad täielikult 2–3 nädala pärast.

Kasutamisyjuhend

Herbitsiidi Rodeo Plus kasutatakse lühiealiste ja mitmeaastaste umbrohtude tõrjeks järgmistel kasutuseladel: kesadel, viljapuuadades, rohumaadel, kõrrepõldudel, koristuseelne umbrohutõrje rapsil, sinepil, linal, lupiinil, teraviljadel, hernel ja oal ning erinevatel kultuuridel külvi/istutamiseelne ja tärkamiseelne/külvijärgne pritsimine.

Umbrohtu tuleks pritsida, kui õhutemperatuur on vahemikus 15°–25° C, õhuniiskus on kõrge ja umbrohud on aktiivse kasvu staadiumis ega ole kahjustunud põua tõttu.

Rodeo Plus toimib ka madalatel temperatuuridel, kuid siis on mõju märgata hiljem.

Mitmeaastastel umbrohtudel, nt orasheinal, peab olema vähemalt 3–4 lehte, et preparaati saaks imenduda taimesse ja sealtkaudu juurtesse.

Mittesihtmärktaimede kaitsmiseks pidada kinni kulunormile vastavast puhvervööndite ja triivi vähendavate otsikute kombinatsioonist, mille leiab infolehel vastavast tabelist.

Vihmakindlus: pritsimisel optimaalsetes tingimustes tekib preparaadi vihmakindlus üheaastastel kõrrelistel umbrohtudel 1 tunni, orasheinal 2 tunni ja mitmeaastastel umbrohtudel 4 tunni möödumisel pritsimisest.

Kulunorm ja lubatud pritsimiste arv sõltuvad põllukultuurist ja/või olukorrast. Kulunorm jääb vahemikku 1,5 – 6,0 l/ha kohta ning maksimaalselt on lubatud pritsida 1–3 korda.

Intervall kasutuskordade vahel: istutus- ja külvieelsel pritsimisel 21 päeva ning viljapuuadade reavahedel ja kesadel 28 päeva.

Ooteaeg: koristuseelne umbrohutõrje teraviljadel, rapsil, sinepil, linal, lupiinil, hernel ja oal – 10 päeva; viljapuuadade reavahed – 30 päeva.

Vee kogus on 100–200 l/ha, käsipritsiga 100–500 l/ha.

Kasutuspiirang: toote kasutamine on keelatud saagi koristuseelseks närvutamiseks või kuivatamiseks, koolialadel, laste mänguväljakutel ja tervishoiuasutuste vahetus läheduses.

Vahendiga töödeldud aladel mitte karjatada ning niidetud heina ja teisi kultuure mitte kasutada loomasöödaks.

Taimekaitsevahendit on keelatud kasutada põllumajanduskultuuride õitsemise ajal ja ka siis, kui töödeldaval alal esineb õitsvat umbrohtu.

Toimeaine	glüfosaat 360 g/l
Pakend	20 l, lahustuv kontsentraat
Tootja	Bayer

[Registri andmed](#)

[Ohutuskaart](#)

activeIngredient:

glüfosaat 360 g/l

Pakend:

20 l, lahustuv kontsentraat

costRate:

Kulunorm 1,5 – 6,0 l/ha, maksimaalselt 1–3 korda

Taimekaitsetunnistus nõutav:

Ei

Tootja

Bayer AG

