

Shirlan 500 SC

Fungitsiid kartuli–lehemädaniku tõrjeks ja mugulate pruunmädanikku nakatumise vältimiseks. Laiendatud kasutusala avamaa sibulale ebajahukaste ja sibula hahkhallituse tõrjeks.

Toime

Shirlan on kaitsev kontaktse toimega preparaat.

Kasutamine

Laiendatud kasutusala väikese kasvupinnaga kultuurile: avamaa sibul.

NB! Kuna Shirlan 500 SC on laiendatud kasutamiseks avamaa sibulale professionaalse kasutaja taotluse alusel, vastutab toote tõhususe või fütotoksilisuse eest selle kasutaja.

Shirlani kasutatakse profülaktiliselt, enne haiguse ilmumist. Esimest korda tuleb fungitsiidiga pritsida, kui ilm on haiguse levikuks soodne, hiljemalt enne kartulitaimede kokkukasvamist vagudes.

Kartul

Preparaadi kulunorm on 0,3–0,4 l/ha, töölahusel 200–500 l/ha. Pritsida intervalliga 7–14 päeva, olenevalt lehemädanikku nakatumise ohu suurusest. Maksimaalne pritsimiste arv on 10 korda, ooteaeg 7 päeva.

Sibul

Haigused	Kulunorm, l/ha	Vee kogus, l/ha	Pritsimiste arv	Intervall, p	Ooteaeg, p
Lehemädanik, pruunmädanik	0,3 – 0,4	200 – 500	max 8	7 – 14	7

Haigused	Kulunorm, l/ha	Vee kogus, l/ha	Pritsimiste arv	Ooteaeg, p
Ebajahukasted, sibula hahkhallitus	0,5	200–400	1	7

Paagisegud

Preparaati võib kasutada koos mangaan- ja magneesiumsulfaadiga. Kahtluse korral tuleb paagisegu sobivust eelnevalt väikesel pinnal katsetada.

Dokumendid

[Registri andmed](#)

[Ohutuskaart](#)

waterAmount:

200–500 l/ha

costRate:

0,3–0,4 l/ha

Pakend:

1 l, suspensioonikontsentraat

Toimeaine(d):

fluasinaam 500 g/l

Taimekaitsetunnistus nõutav:

Jah

Tootja

ISK Biosciences