

Switch 62,5 WG

Switch 62,5 WG on kontaktse ja süsteemse toimega fungitsiid maasikate, marjapõõsaste, dekoratiivtaimede ja liblikõieliste köögiviljade seenhaiguste tõrjeks.

Laiendatud kasutusala väikese kasvupinnaga kultuuridele: õuna- ja pirnipuud, ploomi- ja kirsipuud (õitsemise ajal), vaarikas ning kasvuhoones kurk, tomat, suvikõrvits, puukool ja golfimuru.

Toime

Fludioksoniil ja tsüprodiniil on laboratoorsetes katsetes näidanud väga head mõju taime patogeenide kottseente ja teisseente vastu, osaliselt hallikulaadsete ja hahkhallituse vastu. Fludioksoniil ja tsüprodiniil on mõjusad kõigi nende patogeenide vastu. Preparaat saavutab vihmakindluse 2 tunniga.

Kasutamine

Söögikõlbulikke taimi ei tohi pritsida hiljem kui 14 päeva enne saagi koristust. Kasutades soovituslikust väiksemat vee kogust, võib herbitsiidi efektiivsus väheneda.

NB! Kuna Switch 62,5 WG on laiendatud kasutamiseks õuna-, pirni-, ploomi- ja kirsipuudele, vaarikale ning kasvuhoones kurgile, suvikõrvitsale, tomatile, puukoolile ja golfimurule professionaalse kasutaja taotluse alusel, vastutab toote tõhususe või fütotoksilisuse eest selle kasutaja.

Maasikas

Hahkhallituse ja antraknoosi vastu aitab Switch 62,5 WG-ga pritsimine nii enne kui pärast õitsemist ja ka enne koristust.

Marjapõõsad

Nagu maasikategi puhul, aitab hahkhallituse ja antraknoosi vastu. Pritsida võib nii enne kui pärast õitsemist ja ka enne koristust.

Liblikõielised köögiviljad

Kaunadeta tarvitatavatel liblikõielistel köögiviljadel tõrjub Switch 62,5 WG hahkhallitust, jahukastet, laikpõletikku ja valgemädanikku. Pritsida võib õiepungade moodustumisest kuni viljumise lõpuni.

Dekoratiivtaimed

Hahkhallituse ja puuviljamädaniku tõrjeks pritsida esimeste haigustunnuste ilmunisel.

Puukool

Hahkhallituse ja kottseente tõrjeks pritsida esimeste haigustunnuste ilmunisel.

Golfimuru

Pritsida sügisel esimeste haigustunnuste ilmunisel.

Haigused	Kulunorm, kg/ha	Vee kogus, l/ha	Pritsimiste arv	Intervall, p	Ooteaeg, p
Hahkhallitus, antraknoos	1,0	300–500	3	10	1 –3

Haigused	Kulunorm, kg/ha	Vee kogus, l/ha	Pritsimiste arv	Intervall, p	Ooteaeg, p
Hahkhallitus, antraknoos	1,0	300–500	3	10	7

Haigused	Kulunorm, kg/ha	Vee kogus, l/ha	Pritsimiste arv	Intervall, p	Ooteaeg, p
Hahkhallitus, jahukaste, laikpõletik, valgemädanik	1,0	300–500	2	10 – 14	14

Haigused	Kulunorm, kg/ha	Vee kogus, l/ha	Pritsimiste arv	Intervall, p	Ooteaeg, p
Hahkhallitus, puuviljamä- danik	1,0	300–500	3	10 – 14	–

haigused	Kulunorm, kg/ha	Vee kogus, l/ha	Pritsimiste arv	Intervall, p	Ooteaeg, p
	1 kg/ha	1000	3	10	–

Hahkhallitus, kottseened					
-----------------------------	--	--	--	--	--

haigused	Kulunorm, kg/ha	Vee kogus, l/ha	Pritsimiste arv	Intervall, p	Ooteaeg, p
Fusarioosid, antraknoos, lumiseen, tüfoloos	1 kg/ha	400–800	3	10–14	–

Paagisegud

Segunematust teiste fungitsiidide ja insektitsiididega ei ole täheldatud, kuid soovitatav on siiski teha eeltest, et jälgida saadud pritsimislahuse füüsikalisi omadusi ja mõju kultuurile testile järgnevatel päevadel.

[Registri andmed](#)

[Ohutuskkaart](#)

activeIngredient:

tsüprodiniil 375 g/kg, fludioksoniil 250 g/kg

Pakend:

250 g, vees lahustuvad graanulid

costRate:

1,0 kg/ha

waterAmount:

300–500 l/ha

Taimekaitsetunnistus nõutav:

Ei

Tootja

Syngenta AG



<https://www.syngenta.ee/>