

Teppeki

Valiva toimega süsteemne insektitsiid, mis tõrjub enamlevinud lehetäiliste liike teraviljadel, rohelisel hernel, kartulil, õuna- ja pirnipuul. Laiendatud kasutusala erinevatele köögiviljadele.

Toime

Toimeaine liigub taimes nii üles kui alla. Tootel on ka translaminaarne toime st. toimeaine võib liikuda ühelt lehepoolet teisele, mis omakorda tähendab, et tõrjub ka varjatud kohtades asuvaid lehetäisid. Preparaadiga kokkupuutunud putuka toitumine peatub mõne tunni jooksul, pärast paari päeva sureb kahjur nälga. Toote mõju on näha 4–6 päeva pärast kasutamist. Putukad ei sure kohe, kuid kultuuri kahjustumine lõpeb kohe pärast vahendi kasutamist. Täisnormi kasutamisel püsib efekt kuni 4 nädalat. Toote toimimist ei mõjuta kõrged ega madalad temperatuurid.

Kasutamine

Teppeki kasutusala on laiendatud kapsastel, brüsseli kapsal, kirsil, ploomil, dekoratiivtaimedel, puukoolil, metsataimlall, maasikal, vaarikal, aedmurakal, sõstardel, põldoal, suhkru-, söödapeedil ning porgandil ja kasutamiseks kasvuhoones tomatil, baklažaanil, kurgil, puukoolil, metsataimlall ja dekoratiivtaimedel. Nende kultuuride puhul vastutab toote tõhususe või fütotoksilisuse eest selle kasutaja.

Sõltuvalt taime liigist võib pritsida ühel hooajal 1–3 korda.

Hoiatus! Mesilastele ja teistele tolmeldajatele ohtlik. Keelatud kasutada õitsvatel põllumajanduskultuuridel ja umbrohtudel. Kui ei esine õitsvaid taimi, siis on lubatud kasutada ajavahemikus 22:00–05:00.

Suvi- ja talinisu, spelta nisu, tritikale ja rukis

Pritsida lehetäide tõrjeks kulunormiga 140 g/ha 2 korda hooajal 3 nädalase intervalliga alates esimesest kõrvalvõrsest kuni piimküpsuse lõpuni (kasvufaas 21– 77). Lubatud kasutada ainult kevadel. Vee kulu 150– 300 l/ha.

Suvi- ja talioder, suvi- ja talikaer

Pritsida lehetäide tõrjeks kulunormiga 140 g/ha alates esimesest kõrvalvõrsest kuni piimküpsuse lõpuni (kasvufaas 21– 77).) Lubatud kasutada ainult kevadel. Vee kulu 150– 300 l/ha.

Mitte rohkem kui 1 pritsimiskord hooajal.

Roheline hernes (kaunadeta)

Pritsida herne-lehetäi, oa-lehetäi ja virsiku lehetäi tõrjeks kulunormiga 140 g/ha alates kuuendast lihtsa pärislehe avanemisest kuni 10 % kaunadest on saavutanud ligikaudu täispikkuse, algab paisumine, terade

konsistents nendes on vesine (kasvufaas 16– 71). Lubatud kasutada ainult kevadel. Vee kulu 200– 400 l/ha.

Mitte kasutada koos õlide ja määrgajatega.

Mitte rohkem kui 1 pritsimiskord hooajal. Viimane pritsimine tuleb teha hiljemalt 14 päeva enne koristust.

Kartul

Pritsida virsiku lehetäi, türnpuu lehetäi, suure kartuli lehetäi, paakspuu– (kurgi–) lehetäi tõrjeks kulunormiga 160 g/ha. Tööstuslikku, tärklise– ja toidukartulit ning seemnekartulit on lubatud pritsida alates tärkamisest, kuni viie kahetise pärislehe avanemiseni (kasvufaas 10–15). Vee kulu 200– 500 l/ha. Vee kogus sõltub kartuli suurusest.

Mitte rohkem kui 1 kord hooajal.

Tööstusliku, tärklise– ja toidukartuli pritsimisel mitte kasutada koos õli eel pealekandmisega ega kasutada õlipõhiste lisanditega paagisegudes.

Õunapuu ja pirnipuu

Pritsida õunapuulehetäi, õunapuuteelehe lehetäi ja pirnipuul lehetäi liigi *Dysaphis pyri* tõrjeks kulunormiga 140 g/ha alates õiepungade paisumisest kuni õiepungade puhkemiseni (kasvufaas 51– 59) ja pärast õitsemist, kuni viljad on saavutanud poole oma iseloomulikust suurusest (kasvufaas 71– 75). Vee kulu 200– 1000 l/ha. Vee kogus sõltub puu suurusest, rohelse osa suurusest ja pritsimisest.

Maksimaalselt 3 pritsimiskorda hooajal, 3 nädalase intervalliga. Viimane pritsimine tuleb teha hiljemalt 21 päeva enne koristust.

Dokumendid

[Registri andmed](#)

[Ohutuskaart](#)

activeIngredient:

flonikamiid 500g/kg

Pakend:

2 kg, 0,5 kg, vees dispergeeruvad graanulid (WG)

costRate:

140–160 g/ha, sõltuvalt kultuurist

waterAmount:

150–1000 l/ha



Taimekaitsetunnistus nõutav:

Ei

Tootja

ISK Biosciences