

X-Bond Rumen toksiiinisiduja

Kolmekordse toimega X-Bond Rumen toksiiinisiduja mitte ainult ei seo ega muuda kahjutuks looduslikud mükotoksiinid, vaid lisaks toetab ka loomade jõudlust tänu funktsionaalsele toitainete kompleksile.

Kolmekordse toimega X-Bond Rumen toksiiinisiduja mitte ainult ei seo ega muuda kahjutuks looduslikud mükotoksiinid, vaid lisaks toetab ka loomade jõudlust tänu funktsionaalsele toitainete kompleksile.

80% kõikidest teraviljaanalüüsides sisaldavad mükotoksiine. Mükotoksiinidega saastunud teraviljad ja silod avaldavad suurt mõju looma jõudlusele ja arengule ning seeläbi väheneb ka loomakasvataja tulu. Selle riski vähendamiseks on Vilomix välja töötanud toksiiinisiduja X-Bond Rumen.

X-Bond on kombinatsioon savimineraalidest, hüdrolüüsitud pärmirakkudest ja funktsionaalsetest lisanditest, mille hulka kuuluvad ensüümid, vitamiinid ja mineraalid.

- Savimineraalid seovad mükotoksiine ja takistavad vereringesse sattumist.
- Ensüümid deaktiveerivad mükotoksiine mittetoksilisteks metaboliitideks.
- Kohandatud toitainete kompleks tugevdab soolestikku, maksa ja immunsüsteemi.

Kasutamism normid

Veised

Kuni 15–40 g looma kohta päevas. Kuni 53 g kilogrammi söödaratsiooni kohta (88% KA).

Toortuhk	53,2%
Kaltsium	0,1%
Fosfor	0,9%
Naatrium	3%
Magneesium	0,1%

Lisatud söödalisandid 1 kg kohta

Mükotoksiinide vähendamiseks:

- Bentonite. 1m558 – 415 mg

Progut Extra	23,3%
Melass	0,3%

Pakend	25 kg
Tootja	Dansk Vilomix AS

Kas teadsid?

Mükotoksiinid, mida võib leida pea igast silost ja söödateraviljast, on sageli nähtamatu vaenlane nii looma tervisele kui farmi kasumlikkusele. Silomaterjali satuvad toksiine produtseerivad hallitusseened peamiselt rohumassi sileerimiseks ettevalmistamise käigus ning enamasti toimub kõige ulatuslikum toksiinide produtseerimine sileerimise ajal.

Eelkõige saab vältida mükotoksiinide teket, kui kasutada õiget niitekõrgust, vältida rohumassi mullaga saastumist ning ennetada aeroobseid tingimusi silo korraliku tallamise ning siloaugu kiire täitmise ja sulgemisega. 2011.–2013. aastal läbi viidud uuring näitas, et 100% Eestis valmistatud rohusilodes esines Zearalenooni (ZEA) ja 98% Deoksünivalenooli (DON) ning kõigis testitud maisisilodes avastati nii Zearalenooni kui Deoksünivalenooli.

Söödateraviljadest leidub toksiine enim konserveeritud teraviljas. Sealjuures on ka toksiinide tase keskmine või kõrge. Suure kuivainesisaldusega teraviljades esineb mükotoksiine vähem ning saastatuse tase on enamasti madal ega ohusta loomade tervist.

Lisaks Zearalenoonile ja Deoksünivalenoolile võib söödaterjalis leiduda ka Aflatoksiine, Ohratoksiini, T-2 toksiini ja Fumonisiini. Selleks, et hinnata ohtu loomade tervisele, tuleks mükotoksiinide tase määrata kõikidest silopartiidest ja söödateraviljadest. Ülevaade söötade toksilisusest annab aluse otsustada toksiinisiduja vajalikkuse üle.

Pakend:

25 kg

Koostis:

Savimineraalid, hüdrolüüsitud pärmirakud, funktsionaalsed lisandid, toortuhk 53,2%, kaltsium 0,1%, fosfor 0,9%, naatrium 3%, magneesium 0,1%, Progut Extra 23,3%, melass 0,3%.

Söötmissoovitused:





Veised: Kuni 15–40 g looma kohta päevas. Kuni 53 g kilogrammi söödaratsiooni kohta (88% KA).

Taimekaitsetunnistus nõutav:

Ei

Tootja

Vilomix Finland Oy



<https://vilomix.dk/>