

Zorvec Enicade

Zorvec Enicade on fungitsiid kartuli-lehemädaniku tõrjeks.

Toime

Zorvec Enicade on translaminaarse ja süsteemse toimega fungitsiid kartuli-lehemädaniku (*Phytophthora infestans*) tõrjeks ning seda peab kindlasti kasutama ennetavalt. Töödeldud lehtedes on translaminaarse toime tulemuseks ühtlasem kaitse haiguste eest ja ksüleemisisene süsteemne toime aitab kaitsta neid lehti, mis ei ole pritsimise ajal veel täielikult välja arenenud. Zorvec Enicade omab mõju oomütseetide suhtes ning pärsib mütseeli ehk seeneniidistiku kasvu, spooride moodustumist ja zoosporide idanemist. Fungitsiid kaitseb töödeldud lehti nende kasvades ja lehepinna suurenedes, sealhulgas lehti, mille mõõtmel moodustavad töötlemise ajal alla 20% lõplikest mõõtmetest.

Resistentsuse tekke vältimiseks tuleb alati fungitsiidi Zorvec Enicade kasutada paagisegus koos teiste kartuli-lehemädaniku tõrjeks ettenähtud toodetega. Tooted, mida paagisegus kasutatakse, peavad olema erinevate toimeviisidega.

Zorvec Enicade tähtsamad omadused ja eelised:

- Kaitseb haiguste eest 3–4 päeva kauem kui teised turul olevad fungitsiidid – väiksem pritsimis-sagedus.
- Uute lehtede ja varte kaitse – liigub süsteemselt arenevatesse lehtedesse, mis mängib tähtsat rolli väljakujunenud taimede saagi potentsiaali suurenemisel.
- Vihmakindlus 20 minuti möödudes – võimaldab paindlikku kasutamist ebasoodsates tingimustes ja vähendab vajadust korduspritsimiste järele.

Kasutamine

Zorvec Enicade kulunorm on 0,15 l/ha. Kõige ideaalsem on pritsida ennetavalt, enne esimeste nähtavate haigustunnuste ilmumist.

Kasuta Zorvec'it heade kasvutingimuste ajal ning väldi stressi all kannatavate taimede pritsimist. Kõige varasem pritsimise aeg on BBCH 35 (kui varred ja stoolonid on kuni 50% iseloomulikust pikkusest ja külgharud on alustanud kasvu). Viimase pritsimise ja koristuse vahele peab jääma vähemalt 7 päeva.

Fungitsiidiga võib pritsida ühe kasvuhooaja jooksul maksimaalselt 3 korda järjest. Soovituslik on kasutada 10 päevaste intervallidega, kuid suure haiguse leviku ajal võib kasutada ka 7 päevast intervalli. Maksimaalne kasutuskordade arv kasvuperioodi jooksul on 4.

Zorvec Enicade on vihmakindel 20 minutit peale pritsimist.

Paagisegud

Zorvec Enicade fungitsiidi on kohustuslik kasutada paagisegus koos teiste kartuli-lehemädaniku tõrjeks registreeritud preparaatidega. Paagisegusid puudutavate küsimuste korral võtke juhiste saamiseks ühendust kohaliku esindajaga.

Dokumendid

[Registri andmed](#)

[Ohutuskaart](#)

activeIngredient:

oksatiapiproliin 100 g/l

Pakend:

1 l, õlispersioon (OD)

costRate:

0,15 l/ha

Taimekaitsetunnistus nõutav:

Ei

Tootja

Corteva, Inc. (Corteva Agriscience)

