



DEKORATIIVTAIMED

PISTIKUD JA KASSETITAIMED		PÄRAST POTISTAMIST				
JUUREHAIGUSTE TÕRJE		STRESSI LEEVENDAMINE, TOITAINETE RINGLUSE SOODUSTAMINE	HAHKHALLITUS <i>(Botrytis)</i>	JUUREHAIGUSTE TÕRJE		STRESSI LEEVENDAMINE, TOITAINETE RINGLUSE SOODUSTAMINE
LALSTOP® G46 WG		LALSTIM® OSMO	LALSTOP® G46 WG	MYCOSTOP® <i>Fusarium, Pythium</i>	LALSTOP® G46 WG <i>Pythium, Fusarium, Rhizoctonia, Phytophthora</i>	LALSTIM® OSMO
Pistikute/kasseti taimede sissekastmine enne potistamist	Kasvusubstraati segamine või pistikute/kassetitaimede kastmine	Esimene töötlemine 24h enne stressitingimusi	Esimene töötlemine potistamise ajal, korrata 3 nädala tagant	Esimene töötlemine potistamise ajal, korrata 4-6 nädala tagant		Esimene töötlemine 24h enne stressitingimusi
SISSEKASTMIN E ¹⁾ 0,05 % lahus (10 g/ 20 l vett)	KASVUSUBSTRAATI SEGAMINE 20–50 g/m ³ KASTMINE ³⁾ 0,5–1 g/m ²	LEHTEDE KAUDU PRITSIMINE ²⁾ 6 g/l	LEHTEDE KAUDU PRITSIMINE ²⁾ 250–500 g/ha (Pritsimislahuse kogus 500–2000 l/ha)	KASTMINE VÕI ALTKASTMINE ³⁾ 5–8 g/1000 taime	KASTMINE VÕI TÕUS-MÕÖN SÜSTEEM ³⁾ Vastavalt poti suurusele, 2–50 g/1000 taime	LEHTEDE KAUDU PRITSIMINE ²⁾ 6 g/l

1) Sukelda taimed **LALSTOP® G46 WG** lahusesse nii, et juured ja kasvupunkt on täielikult lahusega kaetud, ei ole vaja leotada.

2) Tooteid **LALSTOP® G46 WG** ja **LALSTIM® OSMO** võib kasutada samas pritsimissegus.

3) Vee kogust võib kohandada vastavalt kasvusubstraadi niiskusele ja kastmisvajadusele.

Paagisegudes kasutamise kohta lisateabe saamiseks võta ühendust tootja või levitajatega: www.verdera.fi
Kasuta taimekaitsevahendit alati ohutul viisil vastavalt etiketil toodud juhistelet.