



# TOMAT JA PAPRIKA

SEEMIKUTE KASVATAMINE	PÄRAST ÜMBERISTUTAMIST		
<b>NÄRBUMISTÕBI</b>	<b>JUUREHAIGUSED</b>	<b>HAKKHALLITUS</b> <i>(Botrytis)</i> <b>TOMATI-VARREPÕLETIK</b> <i>(Didymella)</i>	<b>STRESSI LEEVENDAMINE, TOITAINETE RINGLUSE SOODUSTAMINE</b>
<b>MYCOSTOP®</b>	<b>MYCOSTOP®</b> <i>Fusarium, Pythium</i>	<b>LALSTOP® G46 WG</b>	<b>LALSTIM® OSMO</b>
Töötlemine kohe pärast külvamist või idanemist.	Esimene töötlemine ümberistutamise ajal, korrata 4-6 nädala tagant.	Esimene töötlemine pärast ümberistutamist, korrata 3 nädala tagant.	Esimene töötlemine 24 h enne stressitingimusi. Vajadusel korrata 3 nädala tagant.
<b>KASTMINE VÕI KASVUSUBSTRAADI PRITSIMINE <sup>1)</sup></b> 2–10 g/100 m <sup>2</sup>	<b>TILKKASTMINE VÕI KASVUSUBSTRAADI PRITSIMINE/KASTMINE <sup>1)</sup></b> 5–8 g/1000 taime	<b>LEHTEDE KAUDU PRITSIMINE <sup>2)</sup></b> 250–500 g/ha (Pritsimislahuse kogus 500–2000 l/ha)	<b>LEHTEDE KAUDU PRITSIMINE <sup>2)</sup> VÕI TILKKASTMINE <sup>1)</sup></b> (ainult kivivillal) 2–3 kg/ha (Pritsimislahuse kogus 400–1000 l/ha)

1) Vee kogust võib kohandada vastavalt kasvusubstraadi niiskusele ja kastmisvajadusele

2) Tooteid **LALSTIM® OSMO** ja **LALSTOP® G46 WG** võib kasutada samas pritsimissegus.

**LALSTIM® OSMO** võib kasutada kivivillal tilkkastmissüsteemi kaudu samaaegselt toodetega **MYCOSTOP** ja **LALSTOP® G46 WG**.

Paagisegudes kasutamise kohta lisateabe saamiseks võta ühendust tootja või levitajatega: [www.verdera.fi](http://www.verdera.fi)

Kasuta taimekaitsevahendit alati ohutul viisil vastavalt etiketil toodud juhistele.