



KASVUHOONE KURK

SEEMIKUTE KASVATAMINE		PÄRAST ÜMBERISTUTAMIST			
NÄRBUMISTÕBI		JUUREHAIGUSED		KURGI-LAIKPÕLETIK (<i>Didymella</i>) HAHKHALLITUS (<i>Botrytis</i>)	STRESSI LEEVENDAMINE
Turbasegud: MYCOSTOP®	Kivivill: LALSTOP® G46 WG	Turbasegud: MYCOSTOP® <i>Fusarium, Pythium</i>	Kivivill: LALSTOP® G46 WG <i>Pythium, Fusarium, Rhizoctonia, Phytophthora</i>	LALSTOP® G46 WG	LALSTIM® OSMO
Töötlemine kohe pärast külvamist või idanemist.		Esimene töötlemine ümberistutamise ajal, korrata 4-6 nädala tagant.		Esimene töötlemine pärast ümberistutamist, korrata 3 nädala tagant.	Esimene töötlemine 24 h enne stressitingimusi. Korrata 3 nädala tagant stressiperioodi jooksul.
KASTMINE VÕI KASVUSUBSTRAADI PRITSIMINE ¹⁾		TILKKASTMINE VÕI KASVUSUBSTRAADI PRITSIMINE/KASTMINE ¹⁾		LEHTEDE KAUDU PRITSIMINE ²⁾	LEHTEDE KAUDU PRITSIMINE ²⁾ VÕI TILKKASTMINE ¹⁾ (ainult kivivillal)
2–10 g/100 m ²	50–100 g/100 m ²	5–8 g/1000 taime	20–25 g/1000 taime	250–500 g/ha (Pritsimislahuse kogus 500–2000 l/ha)	2–3 kg/ha (Pritsimislahuse kogus 400–1000 l/ha)

1) Vee kogust võib kohandada vastavalt kasvusubstraadi niiskusele ja kastmisvajadusele

2) Tooteid **LALSTIM® OSMO** ja **LALSTOP® G46 WG** võib kasutada samas pritsimises.

LALSTIM® OSMO võib kasutada kivivillal tilkkastmissüsteemi kaudu samaaegselt toodetega **MYCOSTOP** ja **LALSTOP® G46 WG**.

Paagisegudes kasutamise kohta lisateabe saamiseks võta ühendust tootja või levitajatega: www.verdera.fi

Kasuta taimekaitsevahendit alati ohutul viisil vastavalt etiketil toodud juhistele.