



Bioloogiliste toodete  
kasutamise programm

NÄIDIS

Verdera

# MAASIKAS AVAMAAL

ÜMBERISTUTAMINE	ÕITSEMISE AJAL		
JUUREHAIGUSTE TÕRJE	HAHKHALLITUS ( <i>Botrytis</i> )		ÕÖKÜLMA KAHJUSTUSE ÄRAHOIDMINE, TOITAINETE RINGLUSE SOODUSTAMINE
<b>LALSTOP® G46 WG</b> <i>Pythium, Rhizoctonia, Fusarium, Phytophthora</i>	<b>PRESTOP® MIX</b>	<b>LALSTOP® G46 WG</b>	<b>LALSTIM® OSMO</b>
Esimene töötlemine ümberistutamise ajal, vajadusel korrata ühe kuu möödudes	Töötlemine alates õitsemise algusest	Alates õitsemise algusest, korrata 6–7 päeva tagant	Töötlemine 24h enne stressitingimusi
<b>PALJASJUURSETE TAIMEDI SSEKASTMINE <sup>1)</sup></b> 0,05 % suspension <b>KASSETITAIMEDI KASTMINE <sup>2)</sup></b> 12,5 g/1000 taime <b>KASTMINE/TILKKASTMINE <sup>2)</sup></b> 20–25 g/1000 taime	<b>LEVITAMINE TOLMELDAJATE KAUDU <sup>3)</sup></b> 300–500 g/ha õitsemise ajal Lisa õitsemisperioodi vältel igal hommikul või vastavalt vajadusele õhuke kiht dispenserisse, mis asub taru sissekäigu lähedal	<b>LEHTEDE KAUDU PRITSIMINE <sup>4)</sup></b> 250–300 g/ha (Pritsimislahuse kogus 500–1000 l/ha)	<b>LEHTEDE KAUDU PRITSIMINE <sup>4)</sup></b> 2–4 kg/ha (Pritsimislahuse kogus 250–1000 l/ha)

**1)** Sukelda taimed LALSTOP G46 WG lahusesse nii, et juured ja kasvupunkt on täielikult lahusega kaetud. 200 l 0,05 % vesilahusest piisab u 10 000 frigotaimede sissekastmiseks.

**2)** Vee kogust võib kohandada vastavalt kasvusubstraadi niiskusele ja kastmisvajadusele

**3)** Toodet Prestop Mix levitatakse tolmeldajate kaudu. Kasutada 2 dosaatoriga varustatud mesilastaru või 2-3 avatud kimalastaru hektari kohta.

**4)** Tooteid LALSTOP G46 WG ja LALSTIM OSMO võib kasutada samas pritsimissegus.

Paagisegudes kasutamise kohta lisateabe saamiseks võta ühendust tootja või levitajatega: [verdera.fi](http://verdera.fi)

Kasuta taimekaitsevahendit alati ohutul viisil vastavalt etiketil toodud juhistele.



LALLEMAND PLANT CARE