



MAASIKAS KASVUHOONES JA TUNNELIS

ÜMBERISTUTAMINE	PÄRAST ÜMBERISTUTAMIS	ÕITSEMISE AJAL		
JUUREHAIGUSTE TÕRJE	JUURE JA TAIME KASVU SOODUSTAMINE	HAHKHALLITUS (<i>Botrytis</i>)		STRESSI LEEVENDAMINE, TOITAINETE RINGLUSE SOODUSTAMINE
LALSTOP® G46 WG <i>Pythium, Rhizoctonia, Fusarium, Phytophthora</i>	LALRISE® VITA	PRESTOP® MIX	LALSTOP® G46 WG	LALSTIM® OSMO
Esimene töötlemine ümberistutamise ajal, korrata ühe kuu möödudes.	Esimene töötlemine 1–2 nädalat pärast ümberistutamist, korrata 4 nädala tagant	Alates õitsemise algusest	Alates õitsemise algusest, korrata 6–7 päeva tagant	Töötlemine 24h enne stressitingimusi
KASVUSUBSTRAATI SEGAMINE ¹⁾ 20–50 g/m ³ PALJASJUURSETE TAIMEDE SISSEKASTMINE ²⁾ 0,05 % lahus KASSETITAIMEDE KASTMINE ³⁾ 12,5 g/1000 taime KASTMINE/TILKKASTMINE ³⁾ 20–25 g/1000 taime	KASTMINE ³⁾ 200 g/1000 taime	LEVITAMINE TOLMELDAJATE KAUDU ⁴⁾ 300–500 g/ha õitsemise ajal Lisa õitsemisperioodi vältel igal hommikul või vastavalt vajadusele õhuke kiht dispenserisse, mis asub taru sissekäigu lähedal	LEHTEDE KAUDU PRITSIMINE ⁵⁾ 250–300 g/ha (Pritsimislahuse kogus 500–1000 l/ha)	LEHTEDE KAUDU PRITSIMINE ⁵⁾ 2–4 kg /ha (Pritsimislahuse kogus 250–1000 l/ha)

1) Vesilahusena kasvusubstraati segamine, vee kogust võib kohandada vastavalt kasvusubstraadi niiskusele.

2) Sukelda taimed LALSTOP G46 WG lahusesse nii, et juured ja kasvupunkt on täielikult lahusega kaetud. 200 l 0,05 % lahusest piisab u 10 000 frigotaime sissekastmiseks.

3) Vee kogust võib kohandada vastavalt kasvusubstraadi niiskusele ja kastmisvajadusele.

4) Toodet Prestop Mix levitatakse tolmeldajate kaudu. Kasutada 2 dosaatoriga varustatud mesilastaru hektari kohta. Kasvuhoonetes/tunnelites 1–2 kimalastaru/1000 m².

5) Tooteid LALSTOP G46 WG ja LALSTIM OSMO võib kasutada samas pritsimissegus.

Paagisegudes kasutamise kohta lisateabe saamiseks võta ühendust tootja või levitajatega: www.verdera.fi

Kasuta taimekaitsevahendit alati ohutul viisil vastavalt etiketil toodud juhisteile.