



EMATAIMED JA PISTIKUD

PISTIKUD, KÜLVID, SEEMIKUD, POTISTAMINE JA ÜMBERISTUTAMINE

JUURE KASVU SOODUSTAMINE

NÄRBUMISTÕBI JA JUUREHAIGUSED

(*Pythium, Rhizoctonia, Fusarium, Phytophthora*)

JUURESÜSTEEMI TUGEVDAMINE

HAHKHALLITUS

(*Botrytis*)

KESKKONNASTRES SI ENNETAMINE

LALSTIM® OSMO

LALSTOP® G46 WG

LALRISE® VITA

LALRISE® MAX WP

Mükoriisa sümbioos

LALSTOP® G46 WG

LALSTIM® OSMO

Emataimede pritsimine 24 tundi enne pistikute võtmist või pistikute pritsimine potistamise ajal

Kasvusubstraadi töötlemine enne või pärast külvi/potistamist/ümberistutust ¹⁾

Kassetitaimede või pistikute sissekastmine enne istutamist või potistamist

Kasvusubstraati segamine vesilahusena või kastmine istutamise või potistamise faasis

Kasvusubstraati segamine või töötlemine kastmissüsteemi kaudu külvamise, idanemise või potistamise ajal

Pritsimine juurdumise faasis või pärast potistamist/istutamist

Pritsimine vähemalt 24 h enne stressitingimusi

LEHTEDE KAUDU PRITSIMINE

6 g/l

KASVUSUBSTR ATI SEGAMINE

20–50 g/m³

KASVUSUBSTR ADI KASTMINE VÕI PRITSIMINE

²⁾

50–100 g/100 m²

SISSEKASTMINE

E.g. 0,05 %
vesilahus

KASVUSUBSTR ATI SEGAMINE ²⁾

200 g/m³

KASTMINE ²⁾

40 g/
1000 kassetitaimet
200 g/1000
potitaimet

KASVUSUBSTR ATI SEGAMINE ²⁾

250–500 g/m³

KASTMINE ²⁾

100–200 g/10m²
0,1–2 g/pott

TAIMEDE PRITSIMINE

250–500 g/ha

(Pritsimine
500–1000 l/ha)

LEHTEDE KAUDU PRITSIMINE

6 g/l

1) Enne külvi/potistamist/ümberistutamist: kasvusubstraati segamine vesilahusena. Pärast külvi/potistamist/ümberistutamist: kasvusubstraadi kastmine või pritsimine.

2) Vee kogust võib reguleerida vastavalt kasvusubstraadi niiskusele ja kastmisvajadusele.