



TAIMEDE ETTEKASVATAMINE

PÄRAST RENNIDESSE PANEMIST

JUURTE KASVU STIMULEERIMINE

NÄRBUMISTÕBI JA JUUREHAIGUSED

HAHKHALLITUS (*Botrytis*)

JUUREHAIGUSED

STRESSI LEEVENdamINE

LALSTOP® G46 WG

MYCOSTOP® Peamiselt *Fusarium*

LALSTOP® G46 WG Peamiselt *Pythium* või *Rhizoctonia*

LALSTOP® G46 WG

MYCOSTOP®

LALSTIM® OSMO

Enne külvi
kasvusubstraati
segamine¹⁾

Seemnete töötlemine enne
külvi või kastmine pärast
seemikute tärkamist

Kasvusubstraadi
kastmine või pritsimine
pärast külvi

Seemikute pritsimine
väikeste seemikute faasis
või pistikute sissekastmine,
korrata 3 nädala tagant

Mycostop-lahuse lisamine
ringlevale toitelahusele,
korrata 1-2 nädala tagant,
sõltuvalt haigusurvast

Töötlemine 24h enne
stressitingimusi

KASVUSUBSTRAATI SEGAMINE

20-50 g/m³ peat

SEEMNETE TÖÖTLEMINE

2-8 g/kg
seemneid

KASTMINE ²⁾

2-10
g/100 m²

SEEMIKUTE KASTMINE ²⁾

50-100 g/100 m²

LEHTEDE KAUDU PRITSIMINE VÕI SISSEKASTMINE

Nt. 0,05 % lahus
(10 g/20 l vett)

TOITELAHUSELE LISAMINE

1 g/1000 taime

LEHTEDE KAUDU PRITSIMINE

6 g/l

1) Segada enne külvi kasvusubstraati vesilahusena või pulbrina. Segada hoolikalt.

2) Vee kogust võib kohandada vastavalt kasvusubstraadi niiskusele ja kastmisvajadusele

Substraadi töötlemisel erinevate mikroobsete toodetega on soovitatav jätta ühenädalane intervall.

Paagisegudes kasutamise kohta lisateabe saamiseks võta ühendust tootja või levitajatega: www.verdera.fi

Kasuta taimekaitsevahendit alati ohutul viisil vastavalt etiketil toodud juhiste.