



Bioloogiliste toodete
kasutamise programm
NÄIDIS



VAARIKAS JA PÕLDMURAKAS

ÜMBERISTUTAMINE	PÄRAST ÜMBERISTUTAMIS	ÕITSEMISE AJAL		
JUUREHAIGUSTE TÕRJE	JUURTE KASVU STIMULEERIMINE, TAIME KASVU SOODUSTAMINE	HAKKHALLITUS <i>(Botrytis)</i>		ÖÖKÜLMA KAHJUSTUSE ÄRAHOIDMINE, TOITAINETE RINGLUSE SOODUSTAMINE
LALSTOP® G46 WG <i>Pythium, Rhizoctonia, Fusarium, Phytophthora</i>	LALRISE® VITA	PRESTOP® MIX (ainult vaarikas)	LALSTOP® G46 WG	LALSTIM® OSMO
Esimene töötlemine ümberistutamise ajal, vajadusel korrata ühe kuu möödudes	Esimene töötlemine 1–2 nädalat pärast ümberistutamist, korrata 4 nädala tagant	Alates õitsemise algusest	Alates õitsemise algusest, korrata 7 päeva tagant	Töötlemine 24h enne stressitingimusi
ÜLESSULATATUD JUUREPALLIDE SISSEKASTMINE ¹⁾ 0,02 % lahus (20 g/100 l) PALJASJUURSETE TAIMEDE SISSEKASTMINE ¹⁾ 0,05 % lahus (50 g/100 l) KASTMINE/TILKKASTMINE ²⁾ 25–30 g/1000 taime	KASTMISSÜSTEEMI KAUDU ²⁾ 200 g/1000 taime	LEVITAMINE TOLMELDAJATE KAUDU ³⁾ 300–500 g/ha õitsemise ajal Lisa õitsemisperioodi vältel igal hommikul või vastavalt vajadusele õhuke kiht dispenserisse, mis asub taru sissekäigu lähedal	LEHTEDE KAUDU PRITSIMINE ⁴⁾ Tunnelites 250–300 g/ha Avamaal 300–400 g/ha (Pritsimislahuse kogus 600–1000 l/ha)	LEHTEDE KAUDU PRITSIMINE ⁴⁾ 2–4 kg/ha (Pritsimislahuse kogus 250–1000 l/ha)

1) Sukelda taimed LALSTOP G46 WG lahusesse nii, et juured on täielikult kaetud.

2) Vee kogust võib kohandada vastavalt kasvusubstraadi niiskusele ja kastmisvajadusele

3) Toodet Prestop Mix levitatakse tolmeldajate kaudu. Kasutada 2 dosaatoriga varustatud mesilastaru hektari kohta. Kasvuhoonetes/tunnelites 1–2 kimalastaru/1000 m²

4) Tooteid LALSTOP G46 WG ja LALSTIM OSMO võib kasutada samas pritsimisesegus.



LALLEMAND PLANT CARE