



Verdera

JUURE TÖÖTLEMINE ÜMBERISTUTAMISEL

ÕITSEMISE AJAL

VILJADE VALMIMISE AJAL

VÄLJASPOOL SAAGIPERIOODI

STIMULEERIB JUURE KASVU, SOODUSTAB
TAIME KASVU JA PARANDAB
TOITAINETE OMASTAMIST

SÜDAMIKUMÄDANIKU JA
TEISTE SÄILITUSHAIGUSTE
ENNETAMINE
Botrytis, Fusarium

ÖÖKÜLMA
KAHJUSTUSE
ÄRAHOIDMINE

VILJADE LÖHENEMISE
ÄRAHOIDMINE,
VILJADE KVALITEEDI
PARANDAMINE

VILJAPUU-TÜVEVÄHI
ENNETAMINE
KEVADEL/SÜGISSEL
Neonectria

LALRISE® VITA

LALRISE®
MAX WP

PRESTOP MIX®

LALSTIM® OSMO

LALSTOP® G46 WG

Esimene töötlemine
ümberistutamise ajal,
korrata ühe kuu
möödudes.

Töötlemine
ümberistutamise
ajal.

Alates õitsemise algusest.

Õitsemise ajal.
Töötlemine vähemalt
24 h enne madalaid
temperatuure.

Kirss ja ploom: kui viljad
muudavad värvi ja
1 nädal enne
saagikoristust.

Õun ja pirn: 4 nädalat
enne saagikoristust.

Kevadel, kui pungad puhkevad.
Sügisel pärast saagikoristust või
kui lehed langevad.

KASTMINE ¹⁾

2 g / puu
(vee kogus 1 l/puu)

KASTMINE VÕI
TILKKASTMINE ¹⁾

0,5–2,5 g/puu või
0,5 kg–1 kg/ha

LEVITAMINE
TOLMELDAJATE KAUDU²⁾

300–500 g/ha õitsemise ajal.
Lisa õitsemisperioodi vältel igal
hommikul või vastavalt
vajadusele õhuke kiht
dispenserisse, mis asub taru
sissekäigu lähedal

LEHTEDE KAUDU
PRITSIMINE

5–7 kg/ha
(Pritsimislahuse
kogus
500–1000 l/ha)

LEHTEDE KAUDU
PRITSIMINE

4 kg/ha
(Pritsimislahuse kogus
300–1000 l/ha)

LEHTEDE KAUDU PRITSIMINE

300–500 g/ha
(Pritsimislahuse kogus
600–1000 l/ha)

1) Tooteid LALRISE VITA ja LALRISE MAX WP võib kasutada lehtede kaudu pritsimiseks samas segus. Kasutamismäär vastavalt kasutamise programmile.

2) Toodet Prestop Mix levitatakse tolmeldajate kaudu. Kasutada, 2 dosaatoriga varustatud taru hektari kohta.

Paagisegudes kasutamise kohta lisateabe saamiseks võta ühendust tootja või levitajatega: www.verdera.fi

Always use plant protection products in a safe manner, in accordance with the label instructions.

LALLEMAND

LALLEMAND PLANT CARE